

- Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 778. [Augenscheinlich als systematischer Name gebraucht.]
- Hydrae [Holothuria] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 383.
- Hydrochoerus H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 105. — Mammalia.
- hyemalis [Fringilla] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 446. — Fringilla hiemalis. P.
- hyoscella Medusa P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 124. — Medusa hysocella.
- Hypnale Boa P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., III, 1774, p. 146. — Boa hipnale.
- Hypochoeris Chrysomela P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 171. — Chrysomela hypochaeridis.
- «hypophaeus Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 314.» in Sherborn 1902; addendum: — Trochilus striatus.
- «Hystrix Diodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische I. 1785, 69.» in Sherborn, 1902; addendum: — Diodon atringa.
- Hystrix [Spondylus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 55. — Spondylus gaederopus.
- Iacobaeae Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 685. — Phalaena (Noctua) jacobaeae.
- iavaënsis Columba [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 400. — Columba javanensis.
- Ibex [Aries] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 96 (cf. p. 47 u. 97). [— Capra.] [In Sherborn erst aus «G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 382» angeführt.]
- «icterocephalus Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 241.» in Sherborn, 1902; addendum: — Picus chlorocephalus.
- ichthyaetus [Larus] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 811. — Larus ichthyaetus.
- Illanca [Salmo Salar] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 607. — Salmo illanca.
- «iltis Mustela, P. Boddart, Elench. 1785, 87.» in Sherborn, 1902; addendum: — Mustela putorius.
- «imberbis Silurus, err. pro [kursiv!] inermis, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1798, 1361.» in Sherborn, 1902: dele «err. pro inermis, L.» et adde: — Silurus inermis. P.
- imbricornis Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 98. — Cerambyx.
- «immaculata Perca, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 330.» in Sherborn, 1902; addendum: — Perca americana, J. F. Gmelin.
- Imperialis [Eutropia] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 23.
- Imperialis [Harpa] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 18.
- Imperialis [Sol] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 28.
- Imperialis [Voluta] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 17.

- impunctata [Coccinella] — in: Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., Vindobonae, 1767, p. 579. — Coccinella impunctata.
- «incertus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 32.» in Sherborn, 1902; addendum: — Falco dubius, A. Sparrman.
- Incissuratum [Uber] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 21.
- Indicus C[ervus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 102. — Moschus indicus, J. F. Gmelin.
- indicus C[orvus] b[rachyurus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 424. — Corvus bengalensis. P.
- indicus F[alco] g[entilis] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 168. — Falco communis var. indicus.
- indicus O[riolus] G[albula] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 458.
- indicus [Psittacus] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 86.
- «indicus Rosmarus, P. Boddaert, Elench. 1785, 169.» in Sherborn, 1902; addendum: — Trichechus dugung.
- «indica Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13. I. 1788, 289.» in Sherborn, 1902; addendum: — Otus bakkamoena.
- Indicus [Trichurus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 246. — Trichiurus.
- inermis Silurus M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem XX, 1782, p. 338. [Cit. nach J. J. Walbaum in: P. Artedi, 1792, p. 575 (hier errore XXII statt XX: s. Gmelin in Linné, 1789, Pars III., p. 1361 und Carus u. Engelmann, 1861, 2, p. 992).]
- «inflator Sygnathus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 172.» in Sherborn, 1902; addendum: — Syngnathus. P.
- Inflator Sygnatus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Nat.-Syst. III, 1798, p. 798. — Syngnathus. P.
- Inflator Syngnathus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 9.
- inpennis Alca [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 310. — Alca impennis.
- inpunctata Coccinella [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 53. — Coccinella impunctata. P.
- inpustulata Coccinella [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 57. — Coccinella impustulata.
- inquisitor Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 105. — Cerambyx.
- Insignitum [Buccinum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 34. — Murex rubecula.
- «integra Anomala, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799 119.» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- «interpunctata Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1075.» in Sherborn, 1902; addendum: — Lacerta punctata, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10.

- Iris Cepola* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium. Ichthyol. Pars III., 1792, p. 617. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III. 1798, 317» angeführt.]
- irroratus* Cerambyx [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 107. — *Cerambyx*.
- Islandica* [Balaena Mysticetus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792 [Vorrede «vor der Ostermesse 1792» datiert], p. 765.
- islandicus* F[alco] g[yrfalco] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 138. — *Falco candicans islandicus*.
- italicus* Falco J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], II, 1791, p. 294.
- italicus* F[alco] g[entilis] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 169. — *Falco communis*, var. *italicus*.
- «*italicus* Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 71.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lanius minor*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
- jacobaea* [Phalaena] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 258. — *Phalaena iacobeae*. P.
- jacobine* Loxia [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 427. — *Loxia jacobin*.
- Jaculator* Coluber P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 3. Th., 1774, p. 181. — *Coluber jaculatrix*.
- Jaculator Sciaena* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 309. — *Sciaena Jaculatrix*. P.
- Jaculatrix* Sciaena Pallas, Philos. Trans. LVI, 1766, 1767, p. 187. [In Sherborn erst aus «J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 121» angeführt.]
- «*jagonis* Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 352.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Perca nigra*, J. F. Gmelin.
- «*jaguar* Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 90.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Felis onca*.
- jaikanus* F[alco] M[ilvus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 121. — [Anscheinend] *Falco* (*Aquila*) *milvus*; var. *jaicensis*.
- «*jamaicensis* Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1830.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lamia biasciata*.
- Japanicus* [Labrus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 469. — *Labrus japonicus*.
- japonicus* [Falco] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 13. — *Falco japonensis*. [In Sherborn erst aus «L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1246» angeführt.]
- japonicus* Mullus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III, 1792, p. 620.

- japonicus M[ullus] i[mberbis] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth. 1799, p. 601. — Mullus japonicus.
- japonica Percis J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 697. — Cottus.
- Jatrophae Papilio [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 250 [nom. nud.].
- jatrovaria [Phalaena] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 268. — Phalaena (Geometra) jatropharia.
- javanicus [Cervus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 102. (cf. p. 47). — Moschus.
- Jendaya [Psittacus] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 92. — Psittacus jandaya. [In Sherborn erst aus «F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 205» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- Jordain Sciaena J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 311.
- Jota [Vultur Aura] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [1. T.], 1788, p. 247. — Vultur jota.
- jubata [Columba] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 594. — Columba domestica, var. jubata.
- Judae [Otis] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 62. — Voluta auris-judae.
- «jugularis Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 351.» in Sherborn, 1902; addendum: — Turdus ater.
- «junceti Sturnus, J. Latham, Index Orn. 1790, 326.» in Sherborn, 1902; addendum: — Sturnus obscurus.
- Juniperella Phalaena [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 251 [nom. nud.].
- «jupujuba Oriolus, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 5, 1797, 172.» in Sherborn, 1927; addendum: — Oriolus persicus.
- juvencus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 106. — Cerambyx.
- «kagolca Anas, S. G. Gm., Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 527.» in Sherborn, 1902: delendum [s. Anas penelope; var. kagolca. P. und oben p. 484 f.]
- kalappa [Cancer] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 402. — Cancer calappa.
- Kanguro [Didelphis] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 78. — Didelphis kenguru.
- «kapirat Notopterus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 189.» in Sherborn, 1902; addendum: — Gymnotus notopterus.
- «karrak Anarhichas, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 299.» in Sherborn, 1902; addendum: — Anarhichas minor.
- Katodon Physeter P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., I, Th., 1773, p. 497. — Physeter catodon, Linnaeus.

- Kephalopterus S[imonia] —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 30. — Cercopithecus.
- Keptuschka [Tringa] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 1061. — Tringa keptuschka.
- «kiriwoula Vespertilio, P. Boddaert, Elench. 1785, 70.» in Sherborn, 1902; addendum: — Vespertilio hispidus.
- Kisatch [Salmo] J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium. Ichthyol. Pars III., 1792, p. 720. (cf. p. 70). — Salmo hisutch.
- Kisutch Salmo J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 648. — Salmo Hisutch.
- Kita Salmo J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 648. — Salmo Keta.
- Kleinii M[ugil] C[ephalus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 737.
- Knjaesziok [Parus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 776. — Parus knjaescik.
- Köhleri Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 105. — Cerambyx kaehlerii.
- Koehlerii [Cerambyx] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 270. — Cerambyx kaehlerii.
- Koelreuterii Labrus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 262. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III. 1798, 480» angeführt.]
- Koschar Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 345. — Perca summana, v. fusco-guttata.
- Koupara Can[is] —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 199.
- Kundscha [Salmo] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, III. T., 1789, p. 1373. — Salmo (Truttac.) kundsha.
- labradora [Alca] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 793. — Alca labradorica.
- labradora [Anas] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 859. — Anas labradoria.
- labradorus [Turdus] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 342. — Turdus labradorius.
- labrata Chrysomela [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 71. — Chrysomela labriata. P.
- Labriata Chrysomela P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 191. — Chrysomela labiata.
- Lacertina Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 706. — Phalaena (Geometra) lacertinaria. [In Sherborn erst aus «A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 40» angeführt.]
- «lacertina Siren, Linnaeus, Syst. Nat., ed., 12, 1766 [addenda at

- end of vol. I].» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1902; pro «1766» lege: 1767.
- laevigata Asteria P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 138. — Asterias.
- laevis Salmo J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 60.
- «lagurus Lemmus (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75. — Mus.» in Sherborn, 1902: delendum (kommt nicht vor, sondern nur [Mus] Lagurus).
- lamed Cerambis [errore pro: Cerambix] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 104. — Cerambyx.
- lanarius Ichneumon [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 249 [nom. nud.].
- lanatus [Phasianus] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 628. — Phasianus gallus, var lanatus. [In Sherborn, 1902 als «morio [fett!] Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 628... var. [kursiv!]... lanatus.» angeführt.]
- lanceolaris Limax [ex «Limacis lanceolaris»] [errore pro: lanceolatus] P. S. Pallas, Spicileg. Zool., Fasc. X., 1774, p. 19.
- lanceolatus Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 627. — Chaetodon.
- «Langaha J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 223. — R.» in Sherborn, 1902: delendum [= Langaha B. G. E. de Lacépède, welchen Donndorff ausdrücklich citiert].
- Lanx [Tellina] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 46. — Tellina remies.
- lardarius Vespertilio P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd. 1776, p. 15. — Vespertilio noctula.
- Lasurus [Vespertilio] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 71. — Vespertilio lasiurus.
- «lathamii Lanius, G. A. Suckow, Naturg. II [1] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] 1800, 258.» in Sherborn, 1902; addendum: — Lanius americanus, J. Latham.
- Lathrus J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars IV., 1789, p. 1587. — Lethrus.
- «latipennis Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 310.» in Sherborn, 1902; addendum: — Trochilus campylopterus.
- Latissimus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 39. — Strombus.
- Latruncularius [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 13.
- latus S[almo] L[avaretus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 686. — Salmo thymallus -latus.
- «lemmus Lemmus (Linn.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75. — Mus.» in Sherborn, 1902; delendum (kommt nicht vor, sondern nur [Mus] Lemmus).
- Lenock Salmo J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 73. — Salmo lenok.

- Leopard Felis [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 84. — Felis leopardus.
- Leopardalis [Acus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 31. — Buccinum subulatum.
- Leopardalis [Cypraea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9.
- «leopardus Felis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 509.» in Sherborn, 1902: delendum [= Felis leopardus, J. C. D. Schreber, welche Erxleben ausdrücklich citiert.]
- Lepadogaster Cyclopterus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 490. — Cyclopterus lepodogaster.
- Leporinus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38.
- leporina [Cavia Aguti] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, 1. T., 1788, p. 121. — Mus leporinus. [In Sherborn, 1902 anscheinend dieselbe Form als «aguti [fett!] Cavia, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, varr. [kursiv!] leporina, 218.» angeführt.]
- Lepturus [Trichurus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 245. — Trichiurus.
- «lepus Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 456.» in Sherborn, 1902; pro «456» lege: 457, et adde: — Blennius ocellaris.
- Lernea J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 328. — Lernaea. [In Sherborn erst aus «H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 528» angeführt.]
- Leucaëtos Falco J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 133. — Falco albus, G. Shaw.
- leucocephalus F[alco] g[entilis] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 167. — Falco communis, var. leucocephalus.
- leucogenus [Turdus] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 341. — Turdus aurantius.
- leucogerana Ardea (grus) P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 109 [«grus» ist hier in subgenerischem Sinne gebraucht.] — Grus leucogeranus.
- Leucogeros Grus J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 132. — Grus leucogeros.
- leucoma C[orvus] M[onedula] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 407.
- leucomela [Muscicapa] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 469. — Motacilla.
- leucomelas [Mergus Serrator] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, II. T., 1788, p. 546.
- «leuconotus Colius, J. Latham, Index Orn., 1790, 369.» in Sherborn, 1902; addendum: — Colius erythropus.
- Leucophthalmus Carabus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 354. — Carabus leucophthalmus.

- leucophylla [Rana] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III, 1789, p. 1055. — Rana leucophyllata.
- Leucopictus [Arctomys Citellus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792, p. 486. [In Sherborn erst aus «J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II, 1800, 453» angeführt.]
- leucopyx Corvus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 388. — Corvus graculinus.
- Leucordia [Platalea] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 938. — Platalea leucorodia.
- Leucorix [Antilope] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 99 (Cf. p. 47). [— Antilope leucoryx].
- «leucoryn Lanius, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.» in Sherborn, 1922: delendum [vide infra Lanius leucorynchos].
- leucoryncha [Alcedo] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 260. — Alcedo leucorhyncha.
- leucoryn[chos] Lanius Linnaeus, Mantissa Plant. altera, 1771, p. 524 [In Sherborn, 1902 als «leucoryn [fett!] Lanius, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.» angeführt.]
- leucorypha Falco (s[ive] Aquila) P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 65. — Aquila [Von Sherborn als «leucoryphos Falco (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 259. — Aquila.» angeführt.]
- leucoura Loxia [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 427. — Loxia leucura, P. L. S. Müller.
- leucurus Trochilus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 291. — Trochilus leucurus.
- leucurus Chaetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 625. — Chaetodon.
- Libum [Placenta] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 64. — Echinus rosaceus.
- Lichinella Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 759. — Phalaena (Tinea) lichenella.
- liciatius Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 110. — Cerambyx. P.
- liciatius [Cerambyx] Linné, Syst. Nat., 12. Aufl., I, Pars II., 1767, p. 636. [In Sherborn erst aus «J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1851» angeführt.]
- «limandoides Pleuronectes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1232.» in Sherborn, 1902: delendum [= Pleuronectes limandoides M. E. Bloch].
- Limandoides [Pleuronectes] E. Pontoppidan, Kurzgef. Nachr. Naturhist. Dänemark. Aus d. Dän. übersetzt. 1765, p. 188.
- Linckii L[utjanus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 545. — Lutjanus linkii.

- linearis [Cerambix] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 106. — Cerambyx.
- Lineatus [Acus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 31. — Buccinum lanceatum.
- Lineatus [Balanus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 56.
- lineatus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 99. — Cerambyx.
- lineatus Choetodon [P. Höslin], Ritter Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 625. — Chaetodon.
- Lineatus [Obeliscus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 24. — Trochus dolabratus.
- I ineata [Patella] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 2.
- Lineatum [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
- Linneella Ph[alaena] Tinea Linnaeus, Fauna Suec., 2. Aufl., 1761, p. 362. — [Phalaena] linneella.
- Linniella Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 755. — Phalaena linneella.
- litera S Chrysomela [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 68. — Chrysomela s-litera.
- Literatus [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 12. — Conus litteratus.
- Literatus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49. — Venus.
- litoralis Triton [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 441. — Triton littoralis. P.
- Litterana Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 724. — Phalaena (Tortrix) literana.
- litterata Venus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 277. — Venus literata. [In Sherborn erst als «litterata [fett!] Venus, err. pro [kursiv (2 Wörter)!] literata, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3293.» angeführt.]
- littoralis Triton P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 102. — Triton littoreus.
- littorea [Tringa ochropus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II. 1788, p. 677. — Tringa littorea.
- lividus F[alco] p[ygargus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 135.
- Locustella Alauda J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 216.
- Loeflingii Labrus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 262. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III. 1798, 480» angeführt.]
- Loënsis Salmo Fario J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 61.
- loligo Saepia, P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 117. — Sepia.

- «lomvia Uria, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 27.» in Sherborn, 1902; addendum: — Alca.
- «longicauda Loxia, J. Latham, Index Orn., 1790, 373.» in Sherborn, 1902; addendum: — Loxia macroura.
- longimanus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 96. — Cerambyx.
- longipinnis Gadus J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 337.
- Longirostris Balistes J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 460.
- longirostris Gracula [ex: «Graculae longirostri»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 151 (cf. p. 194). — Gracula longirostra.
- Loris [Lemur] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 12. — Lemur tardigradus.
- Lucifer Homo J. C. P. Erxleben, Syst. Regni Animal., 1777, p. 6 («fabulosus»).
- lucionensis [Muscicapa] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 476. — Muscicapa luzoniensis.
- lucionensis Psittacus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 234. — Psittacus lucionensis.
- Luconiensis [Psittacus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 281. — Psittacus lucionensis.
- Ludoviciana Emberiza P. L. St. Müller, Ritters Linné Natursyst., 2. Th., 1773, p. 565. — Emberiza ludoviciana. [In Sherborn erst aus «F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 252» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- Lugubris Simia J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792, p. 51. — Cebus.
- luna Asteria P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 131. — Asterias.
- lunaris Phoca [ex: «Phocae lunaris»] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 172. — Phoca Semilunaris. P.
- luridus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 109. — Cerambyx.
- lutea R[ana] m[argaritifera] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere. III, 1798, p. 72.
- Lutra [Lutra] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 167. — Mustela.
- «lutris Lutra (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 446. — Mustela.» in Sherborn, 1902: delendum; kommt nicht vor [vide infra Lutra marina.].
- Lyricea [Musica] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 18.
- «macerona Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 134.» in Sherborn, 1902; addendum: errore pro macroura Columba [s. d. infra].

- macrocephala R[ana] a[r]borea] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 85. — *Hyla rubra*.
- macrolepidotus Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 625. — *Chaetodon*.
- macrolepidotus C[yprinus] c[arpio] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 777. — *Cyprinus macrolepidotus*.
- macrolepidotus Labrus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, 1792, Ichthyol. Pars III., p. 266 (cf. p. 709).
- «macropterus Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 465.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Balistes americanus*.
- macropus T[estudo] Mydas G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 31. — *Testudo macropus*.
- macrorhynchus [Bucco] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 406. [In Sherborn, 1902 als «macrorhynchus [fett!] Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 406.» angeführt.]
- «macrorhynchus Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 406.» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Bucco macrorhynchus].
- macrorynchus [Bucco] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 203. — *Bucco macrorhynchus*. P.
- macrorynchus [Psittacus] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 117. — *Psittacus macrorhynchus*.
- macrotrarsus [Didelphis] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 109. — *Didelphys macrotrarsos*.
- Macroura [Columba] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, Regist. Suppl.-Bd. enthalt. Geschlecht. Arten, p. — *Columba macerona*. P.
- macroura H[istrix] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 497. — *Hystrix*.
- macrourus Ichneumon P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 319. — *Ichneumon macrurus*.
- macroura L[acerta] M[onitor] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 98. — *Stellio saxatilis*.
- Maculatus Cervus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 386. — *Corvus australis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 377.
- maculata C[orvus] P[ica] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 411.
- maculatus Falco J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], II, 1791, p. 306.
- maculatus F[alco] i[slandicus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 193. — *Falco islandus*, var. *maculatus*.

- maculata H[yaena] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. Abth., 1795, p. 89. — *Canis crocuta*. [In Sherborn erst aus «C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. III. 1811, 302» angeführt.]
- Maculatus [Melo] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 16.
- maculatus Mullus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 619. [In Sherborn erst aus «M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII, 1793, 95» angeführt.]
- maculata Muraena [B. G. E. de] La Cépède, Hist. Nat. Poissons, II, An VIII [1800], p. 265. — *Muraena guttata*.
- Maculatus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — *Venus*.
- «maculata Hyaena, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 79 [n. n.] [kursiv!].» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1928: delendum [ist nicht nom. nud.; vide supra *Hyaena maculata* H. F. Link].
- Maculatum [Pyrum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 29. — *Buccinum spiratum*.
- Maculata [Scala] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 23. — *Turbo clathrus*.
- Maculatum [Trapezium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 50. — *Chama calyculata*.
- maculosa Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 350.
- «maculosus Trochilus, G. A. Suckow, Naturg. II [1] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] 1800, 678.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Trochilus maculatus*, J. Latham.
- «madagascariensis Certhia, J. Latham, Ind. Orn. I, 1790, 282.» in Sherborn, 1928; addendum: — *Certhia sovimanga*.
- madagascariensis [Coracias] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 197.
- madagascariensis Corvus J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 376.
- madagascariensis F[alco] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 128.
- «madagascariensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 981.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Motacilla maderaspatana*.
- madagascarius Turd[us] [ex: «Turd. madagascarium»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 210.
- maderaspatanus O[riolus] G[albula] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 457.
- Maderogaster [Simia] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 56. — *Simia maderogaster*.
- magellanica S[trix] B[ubo] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1800, 1. Abth., p. 202.
- magnifica [Paradisaea] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 167.

- magnus Falco J. A. Donndorff, Zool. Beytr., XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 22.
- Maior [Balaena Mysticetus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr., XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792 [Vorrede «vor der Ostermesse 1792» datiert], p. 765.
- maior G[racula] r[eligiosa] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 468.
- Majana Ampelis P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 542. — Ampelis maynana.
- major Accipenser Ruthenus Schoepf, Schrift. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin VIII., 3. St., 1788, p. 186. — Acipenser. P.
- major [Acipenser] Ruthenus J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 353.
- major [Anas] Boschas J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 348 [nom. nud.].
- major [Ardea] Cinerea J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 348 [nom. nud.].
- Major [Cochlus] Delphinus [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 24. — Turbo delphinus.
- Major [Conus] Punctulatus [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 15. — Conus nussatella.
- major [Cyprinus] Brama J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 356.
- major P[aradisea] vulgaris G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 479.
- Major [Patella] Pileus Morionis [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 4. — Patella ungarica.
- Major [Serpula] Harpagium [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 2.
- major [Squalus carcharias] P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. VIII (cf. p. 20).
- Makako [Lemur] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 41. — Lemur macaco.
- Makavouanna [Psittacus], J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 84. — Psittacus makawuanna.
- Maki volans [Lemur] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 41. — Lemur volans.
- malabaricus C[orvus] b[rachyurus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 425.
- malaccensis C[orvus] b[rachyurus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 424.
- malaccensis [Erinaceus] Linné, Syst. Nat., 12. Aufl., I, [Pars I.], 1766, p. 75. — Hystrix brachyura. [In Sherborn, 1902 als «malacensis [fett!] Erinaceus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 75.» angeführt.]
- malacensis [Erinaceus] Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 75.» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Erinaceus malaccensis].

- Mali Aphis [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 245 [nom. nud.].
- Malleus [Margaritifera] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 44. — Ostrea.
- mambrica C[apra] H[ircus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, I, 1797, p. 324. — Capra mambrica.
- mambrica Capra Hircus Linn. [J. C. D. Schreber] Säugthiere, V. Th., [I, 1. Hälfte], tab. CCLXXXV, [1787]. [Betreffs des Datums s. Sherborn, 1892, p. 589.]
- «Manati P. Boddaert, Elench. 1785, 173. — M.» in Sherborn, 1902; addendum: — Trichechus (cf. Boddaert, t. c., p. 53).
- Manatus H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 109. — Mammalia.
- Manatus Trichechus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 174. — Trichechus.
- Mapurita Viverra P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 32 (cf. Regist. sämtl. sechs Th. Linn. Thierreichs, p. 509). — Viverra napurita.
- Maraena Salmo M. E. Bloch, Beschäft. Berlin. Ges. Naturforsch. Freunde IV, 1779, p. 62. [In Sherborn, 1902 als «muraena [fett!] Salmo, M. E. Bloch, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, IV, 1779, 62.» angeführt.]
- «marggravii Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 80.» in Sherborn, 1902; delendum [kommt nicht vor, indem «Marggravii» [kursiv!] nicht ein Speciesname, sondern lediglich ein dem Namen der Species «Salmo (Curimata [kursiv!])» (s. d. supra) beigelegter Hinweis auf den Autor Marggrav [= Marcgrav] ist].
- Marginatus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38. — Strombus marginatus, Linnaeus.
- Marginata Tentredo J. A. Scopoli, Annus V. Hist.-Nat., 1772, p. 121. — Tenthredo.
- «marina Holocentrus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV, 1799, 536. — Perca.» in Sherborn, 1902; pro «marina» lege: marinus.
- marina [Lutra] J. C. P. Erxleben, Syst. Regni Animal., 1777, p. 445. — Mustela lutris. [In Sherborn, 1902 als «lutris [fett!] Lutra (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 446. — Mustela.» und jener Name erst aus «H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 84.» angeführt.]
- marinus Salmo Eperlanus J. J. Walbaum, in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 57. — Salmo Eperlano - marinus. P.
- «maritimus Mus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 140.» in Sherborn, 1902; addendum: — Mus suillus.
- marmorata R[ana] g[ibbosa] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 65. — Bufo marmoratus.

Marmorata [Senectus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 25.
 Marmoreus [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 13.
 Marmotta Mus J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 343.
 — Mus marmota.

Marmotte Vespertilio P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 18. — Vespertilio nigrita.

Marsupialis Didelphys J. C. D. Schreber, Säugthiere, 3. Th., 1776, tab. CXLV (cf. id. t. c., 1778, p. 536). — Didelphis. [Betreffs der Daten s. Sherborn, 1892, p. 588 und Poche, 1912e, p. 131 f.]

marsupialis Vespertilio P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 19. — Vespertilio lepturus.

«martinus Gracula, J. Hermann, Tabl. Aff. Anim. 1783, 195 [teste [kursiv!] Stresemann].» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1928; addendum: — Paradisea tristis.

Maruda Sparus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 277.

mas Salmo Salar J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 58. [Für eine systematische Einheit gebraucht!]

«mascarinus Psittacus J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1. 1788, 333.» in Sherborn, 1902; delendum [=Psittacus mascarinus, Linnaeus].

Masehna Sciaena J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 310. — [errore ? pro:] Sciaena Mahsena.

mastivus Canis J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.] I, 1789, p. 197.

mastivus [Canis Familiaris] J. F. Blumenbach, Handb. Naturgesch., 2. Aufl., 1782, p. 92. — Canis familiaris molossus.

Mastocembelus J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 458. — Mastacembelus.

Mauritana [Motacilla] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II., 2. Th., 1795, p. 641. — Motacilla mauritiana.

mauritiana SpheX, errore pro: mauritanica, Linn., P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., II, 1775, p. 872 (cf. Regist., Sign. e5).

Maurosparus Sparus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 301. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III, 1798, 442» angeführt.]

maxima Sciaena J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 318. — Sciaena faetela.

maximus Squalus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 518, Z. 13 v. u.

maximus S[ygnathus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 171. — Syngnathus.

- maximus* Sygnatus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linné-
 isch. Natursyst., III, 1798, p. 796. — Sygnathus.
 «*maynanensis* Bucco, J. Latham, Index Orn. 1790, 203.» in Sher-
 born, 1902; addendum: — Bucco elegans.
mediterranea [Phoca] [J. Herrmann], Beschäft. Berlin. Ges. Natur-
 forsch. Freunde IV, 1779, p. 502. [Cf. p. XV.] — Phoca
 monachus.
media Saepia, P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6.
 Th., I, 1775, p. 117. — Sepia.
Melanaeetus [Falco] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 10. —
 Falco melanaetus.
melanocephalus L[anius] r[ufus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Natur-
 gesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 241. — Lanius collurio, var.
 melanocephalus.
 «*melanogastra* Loxia, J. Latham, Index Orn., 1790, 394.» in Sher-
 born, 1902; addendum: — Loxia afra.
Melanoleucos Col[uber] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg.
 Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 209. [In Sherborn, 1902 als
 «*melanoleucus* [fett!] Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beytr.
 III, 1798, 209.» angeführt.]
 «*melanoleucus* Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III, 1798, 209.»
 in Sherborn, 1902; delendum [vide supra Coluber Melanoleu-
 cos].
 «*melanotus* Falco J. Latham, Index Orn. 1790, 16.» in Sherborn,
 1902; addendum: — Falco niger.
 «*melanopis* Tanagra, J. Latham, Index Orn. 1790, 422.» in Sher-
 born, 1902; addendum: — Tanagra atra.
 «*melanopterus* Gobius, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2,
 1792, 204.» in Sherborn, 1902; addendum: — Gobius bicolor.
melanopus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-
 Syst., II, 1782, p. 98. — Cerambyx.
melanoura Loxia [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst.,
 I, 1781, p. 429. — Loxia melanura, P. L. S. Müller.
 «*melanurus* Gobioides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II,
 1800, 576.» in Sherborn, 1902; addendum: — Gobius melan-
 uros.
mellarhina S[imia] [G.] Cuvier, Règne Animal, 2. Aufl., I, 1829, p. 92.
Meleagris C. Nozeman u. A. Vosmaer in: P. H. G. Moehring,
 Geslacht. Vogelen. Uit Latyn vertaald Aantek. vermeerd. door
 C. Nozeman, En uitgeg. Voorred., Aantek. vermeerd. door A.
 Vosmaer. 1758, p. 3 u. 37. — Aves.
Melinus [Bulbus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 31. —
 Bulla rapa. P.
melitaeus Canis [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I,
 1781, p. 65. — Canis meliteus. P.
melitaeus [Canis familiaris] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13.
 Aufl., I, Pars I, 1788, p. 66. — Canis familiaris meliteus.

- melitensis Canis [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 64.
- meliteus Canis P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 208. — Canis familiaris meliteus.
- Melliet Scomber J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 220.
- Melliurus [Meles] J. F. Blumenbach, Handb. Naturgesch., 3. Aufl., 1788, p. 95. — Viverra Ratel. P.
- «melliverous Meles, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 86.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra Meles mellivorus].
- mellivorus [Meles] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 86 (cf. p. 47). — Viverra. [In Sherborn, 1902 als «melliverous [fett!] Meles, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 86.» angeführt.]
- Meminna [Cervus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 102. — Moschus.
- Menima [Lutra] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 168.
- Mephitis [Mustela] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 87. — Viverra zorilla, J. C. D. Schreber.
- Mephitis Viverra J. C. D. Schreber, Säugthiere, 3. Th., [1776], tab. CXXI, [1776] — Viverra memphitis. [Betreffs des Datums s. Sherborn, 1892, p. 558.] [In Sherborn erst aus «[ex [kursiv!] Schreber tab. [kursiv!]] J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 491» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt]
- Mercenarius [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — Venus.
- meridianus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 104. — Cerambyx.
- Merlucius Gadus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 4. Th., 1774, p. 94. — Gadus merluccius.
- Mesoleucus Chaetodon M. E. Bloch, Naturgesch. ausländ. Fische, III, 1787, p. 117.
- «mesomelas Chaetodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1263.» in Sherborn, 1902; addendum: — Chaetodon mesoleucus. P.
- Meulenii Diodon J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 602. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III, 1798, 787» angeführt.]
- mexicana Felis J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 72.
- Midae [Otis] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 62. — Voluta auris-midae.
- Miles Cyprinus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 23. — Cyprinus galian.
- Milkschtsch Salmo J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII, Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 647. — Salmo milkschtsch.
- Minervae Coluber P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 3. Th., 1774, p. 205. — Coluber Minerva.
- miniatus Locusta [ganz offenbar errore pro: Gryllus] P. L. St.

- Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 270 (cf. Regist. sämth. sechs Theile Linn. Thierr., p. 392). — *Gryllus* (Loc.) *miniatus*.
- minimus* *Gadus* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 143.
- minima* *Must[ela]* (*Lutra*) —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 289. — *Lutra*.
- «*minor* *Colymbus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 585.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Uria ringvia*.
- minor* *C[orvus] c[orone]* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 397.
- Minor* [*Cypraea*] *Argus* [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 8. — *Cypraea cribraria*.
- minor* [*Cyprinus*] *Brama* J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 356.
- minor* *E[sox] B[elone]* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 723.
- «*minor* *Lanius*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 310.» in Sherborn, 1902: delendum [vide infra *Lanius infaustus minor*].
- minor* [*Lanius infaustus*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 310. — *Turdus saxatilis*, Linnaeus. [In Sherborn, 1902 als «*minor* [fett!] *Lanius*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 310.» und anscheinend dieselbe Form als «*infaustus* [fett!] *Lanius*, R. Kerr, Anim. Kingd., 1792, var. [kursiv!] *minor*, 557.» angeführt.]
- «*minor* *Lutra*, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 451.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Viverra lutreola*.
- Minor* [*Mus Rutilus*] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792, p. 452.
- «*minor* *Ochotona*, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 74.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lepus ogotona*.
- minor* *P[aradisea] v[ulgaris]* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 480.
- minor* [*Perca*] *Lucio-perca*, J. R. Forster, Philos. Trans. LVII., 1767, 1768, p. 355.
- minor* [*Sciaena*] *gaterina* Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. XII.
- minor* *Sitta* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 548. — *Sitta parva*. P.
- minor* [*Squalus carcharias*] P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. VIII (cf. p. 20).
- minor* *T[estudo] Mydas* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 30.
- minuta* *Asteria* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 133. — *Asterias*.

- minutus* *Cyprinus* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 36. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 757.» angeführt.]
- minutus* *Lepus* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 85.
- «*minutus* *Mergus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 548; var. [kursiv!] *fasciolicus*.» in Sherborn, 1902; delendum [vide *Mergus minutus asiaticus*].
- Mirabilis* [*Terebra*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 24.
- Mirmecophaga* J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 500. — *Myrmecophaga*.
- Missippica* *Tanagra* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 214. [Dieser Name ist in Sherborn, 1928 zwar angeführt, aber an unrichtiger Stelle des Alphabets (nach *missionum* [fett!]).]
- Mississippiensis* [*Tanagra*] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linneisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 454. — *Tanagra mississippiensis*.
- Mitu* [*Crax Alector*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl. I, Pars II, 1788, p. 736. — *Crax mitu*.
- Mochara* [*Sparus*] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 388. — *Sparus scriptus*.
- «*modestus* *Miris*, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 120.» in Sherborn, 1902: pro «Bloch» lege: Block.
- moenas* *Cancer* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., II, 1775, p. 1106. — *Cancer maenas*.
- Mola* *Diodon* M. E. Bloch, Naturgesch. ausländ. Fische, I, 1785, p. 75. — *Tetrodon*.
- «*molinae* *Aptenodytes*, J. Latham, Index Orn. 1790, 881.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Aptenodyta chilensis*.
- molossus* *Canis* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 208. — *Canis familiaris molossus*.
- Monachus* [*Chersina*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 63.
- monacus* *Vultur* P. P. Lapeirouse, Svenska Vet. Akad. Nya Handl. 3, 1782, [p. ? (105—106)]. [Mir ist nur die deutsche Uebersetzung: Schwed. Akad. Neue Abh. Naturlehre 1782, 3, 1785 zugänglich; hier p. 100.]
- Mongus* [*Lemur*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 40. — *Lemur mongoz*. [In Sherborn erst aus «M. T. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 43» angeführt.]
- Monile* [*Haustrum*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 30. — *Buccinum persicum*.
- Monile* [*Pyrum*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 29.
- monstrosus* *C*[*yprius*] [*carpio*] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 779. [Augenscheinlich als Name einer systematischen Einheit gebraucht.]
- montanus* *Cervus* J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands. [1. Aufl.], I, 1789, p. 584.

- monungulus [*Sus Scrofa domesticus*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 218.
- «mordax Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 115.» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- Morhua *Gadus* Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 252. [Dieser Name findet sich bei Sherborn, 1902 zwar angeführt (p. 631), aber an einer unrichtigen Stelle des Alphabets, sodass er also dort schwer zu finden ist.]
- Morinella [*Tringa Interpres*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 671. — *Tringa morinella*.
- Morio [*Cuma*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 35. — *Voluta*.
- «morio Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 628. — *P. gallus* m. L., & varr. [kursiv!] *tophaceus*, *cornutus*, *lanatus*.» in Sherborn, 1902; delendum: «& varr. [kursiv!] *tophaceus*, *cornutus*, *lanatus*.» [Vide infra *Phasianus tophaceus* et supra *Phasianus cornutus* et *Phasianus lanatus*.]
- Morio [*Rhombus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 33. — *Murex morio*, Linnaeus.
- Morrhua [*Gadus*] O. F. Müller, Zool. Danic. Prodr., 1776, p. 42. — *Gadus Morhua*. P.
- «morsus Rosmarus, P. Boddaert, Elench. 1785, 169.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Trichechus rosmarus*.
- moschatus *Cerambix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 103. — *Cerambyx*.
- «moschus *Tragulus*, P. Boddaert, Elench. 1785, 131.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Moschus moschiferus*.
- Muchsan [*Salmo*] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 687. — *Salmo Pidschian* Muchsan. P.
- Muchsan [*Salmo Pidschian*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1378.
- Muchsun *Salmo* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 77. — *Salmo Pidschian* Muchsan. P.
- mucosus* *Blenn[ius]* [ex: «*Blenn[i]* *mucosi*»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 289.
- Muikisi *Salmo* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 86.
- Mulatta [*Simia*] —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 31. — *Cercopithecus*. [In Sherborn erst aus «J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 660» angeführt.]
- Multifolia [*Tridachna*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 50.
- «multipunctatus Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 117» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- multiradiata *Asteria* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 142. — *Asterias*.
- Mummy-Chog *Cyprinus* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Pis-

- cium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 36. [In Sherborn erst aus «J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 447» angeführt.]
- «muraena Salmo, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV, 1779, 62» in Sherborn, 1902; delendum (vide supra Salmo Maraena).
- Murena J. A. Scopoli, Delic. Flor. Faun. Insubr., I, 1786, p. 74. — Muraena.
- murina Didelphis G. Cuvier, Tabl. Élément. Hist. Nat. Animaux, An 6 [1798], p. 126. [In Sherborn, 1902 als «murina [fett!] Didelphys, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 127.» angeführt.]
- Murina Didelphys [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 3. Th., 1778, tab. CXLIX [1777] (cf. p. 545). — Didelphis. [Betreffs des Datums s. Sherborn, 1892, p. 589.]
- «murina Didelphys, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 127.» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Didelphis murina].
- «mus Uranoscopus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 346.» in Sherborn, 1902; addendum: — Uranoscopus scaber.
- Musaeorum Byrrhus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 120. — Byrrhus museorum.
- «mustela Blennius, id. ac [2 Wörter kursiv!] mustelaris?, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 459.» in Sherborn, 1902; delendum: «?» [cf. Lacépède, t. c., p. 484].
- Mustelinus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38. — Strombus auris-dianae.
- Mustella J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 498. — Mustela. [In Sherborn erst aus «G. I. Molina, Ess. hist. Nat. Chili, 1789, 272» angeführt.]
- mustella Gadus [B. G. E. de] La Cepède, Hist. Nat. Poissons, II, An VIII [1800], p. 367 (cf. p. 441). — Gadus mustela.
- Mutabilis [Oliva] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 10. — Voluta oliva.
- Mutabile [Patella] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 3. — Patella caerulea.
- Mutica [Ovis Aries] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 422. — Ovis aries var. anglica.
- «Mya [G. Humphreys] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.], Mus. Calonn. 1797, 59. — L.» in Sherborn, 1902: delendum [= Mya Linnaeus, pt.].
- Mykiss Salmo, J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 59.
- Myxine Petromyzon J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 500. — Myxine glutinosa.
- Nadjil Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 339.
- naevius C[orvus c[orax]] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 400.

- naevia C[orvus] M[onedula] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 407.
- naevius [Falco] J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], II, 1791, p. 306. — Falco maculatus. P.
- naevius F[alco] p[eregrinus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 172. — Falco communis, var. naevius.
- «naevius Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 304.» in Sherborn, 1902; delendum [vide Lanius cayanus naevius].
- naevius [Lanius cayanus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 304. — [In Sherborn, 1902 als «naevius [fett!] Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 304.» und anscheinend dieselbe Form als «cayanus [fett!] Lanius, R. Kerr. Anim. Kingd. 1792, varr. [kursiv!] naevius, . . . 550.» angeführt. (Cf. supra p. 484 f.)]
- naevia [Perdix] Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 649. — Tetrao naevius.
- «namacush Salmo, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 68.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra Salmo Namaycush].
- Namaycush Salmo J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, 647. — Salmo Namaycush. P.
- Namaycush Salmo J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 68. [In Sherborn, 1902 als «namacush [fett!] Salmo, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 68.» angeführt.]
- narboniensis [Parus] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 568. — Parus narbonensis.
- Narhwal [Monodon] J. F. Blumenbach, Handb. Naturgesch., 2. Aufl., 1782, p. 141; wahrscheinlich auch schon op. c., [1. Aufl.], 1779.
- Narinari R[aja] A[quila] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 72. — Raja narinari.
- «narwhal Monodon, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen. no. 44, 1800.» in Sherborn, 1902; delendum [kommt nicht vor; vide supra Monodon Narhwal].
- nasicornis T[estudo] Caretta G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 32. — Testudo nasicornis.
- Nasuca V[iverra] [ex: V[iverrae] Nasucae] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 498. — Viverra nasua.
- Nasus N[otacanthus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 650. — Notacanthus.
- «nasus Squalus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 517.» in Sherborn, 1902; addendum: Squalus cornubicus.
- «nasutus Anguis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1120.» in Sherborn, 1902; addendum: — Anguis roshalis. P.

- nasutus *Holocentrus* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 640.
 «nasutus *Todus* J. Latham, Index Orn., 1790, 268.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Todus macrorhynchus*.
- naucrates *Echeneis* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 609. — *Echeneis naucrates*.
- Nautarum [Crypta] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 4. — *Patella fornicata*.
- Nawaga *Gadus* J. J. Walbaum in P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 128.
- nebulos[us] *Ceramix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 102. — *Ceramix*.
- Nebulosum [Dolium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 19. — *Buccinum olearium*.
- Nepus [Phoca] [J. Herrmann]. Beschäft. Berlin. Ges. Naturforsch. Freunde IV, 1779, p. 502. [Cf. p. XV.] — *Phoca monachus*.
- Neretoidea [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 20. — *Gastropoda*. [In Sherborn, 1902 als «Neritoidea [fett!] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, 20. — G.» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- «Neritoidea [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, 20. — G.» in Sherborn, 1902; delendum [vide supra Neretoidea].
- «nestor *Psittacus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 110.» in Sherborn 1902; addendum: — *Psittacus meridionalis*.
- «neucrates *Remora* (Linn.), J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 20 [n. n. [kursiv!]] — *Echeneis*.» in Sherborn, 1902: delendum [kommt nicht vor, sondern nur der Vulgärname *Remora* für die Art *Echeneis* *neucrates* und die von dieser vertretene Gattung].
- Nexum [Cardium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49. — *Cardium fragum*.
- nictaea *Strix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 212. — *Strix Nyctaea*. P.
- Nigella [Nux] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 59. — *Tellina cornea*.
- nigra [Ardea] *Ibis* J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 349.
- nigra [Corvus] C[ornix] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 412.
- niger *Gobius* [B. G. E. de] La Cépède, Hist. Nat. Poissons, II, An VIII [1800], p. 537 (cf. p. 568).
- niger [Mergus Serrator] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 546.
- nigra *Rhynchops* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 355. — *Rhynchops*. P.
- «nigra *Rhynchops*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 138; ed. 12,

- 1766, 228.» in Sherborn, 1902: delendum [vide infra *Rynchops nigra*].
- nigra* [*Rynchops*] Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 138; Linné, op. c., 12. Aufl., I, [Pars I], 1766, p. 228. [In Sherborn, 1902 als «*nigra* [fett!] *Rhyncops*, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 138; ed. 12, 1766, 228.» angeführt.]
- nigra* [*Spongia*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 609. — *Spongia Cancellata nigra*. P.
- nigra* *Spongia Cancellata* P. L. St. Müller, Ritters Linné volist. Natursyst., 6. Th., II, 1775, p. 799.
- niger* *Ursus Arctos* Linn. [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 3. Th., 1778, tab. CXL, [1776]. [Betreffs des Datums s. Sherborn 1892, p. 588.] [In Sherborn erst aus «J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 100» angeführt.]
- Nigricans* *Choetodon* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 4. Th., 1774, p. 168. — *Chaetodon*.
- Nigricollis* *Motacilla* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 738. — *Sylvia*.
- Nigritis* [*Conus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 13.
- «*nigrofuscus* *Gobius*, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 536.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Gobius bicolor*.
- «*nigrophthalmus* *Staphylinus*, L. H. v. Bloch in Becker, Plau, Grund. 1799, 117.» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- niloticus* *Salmo* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 82. — *Salmo aegyptius*.
- Nitidula* [*Mus*] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 110. — *Mus nitedula*.
- Nitidus* [*Dactylus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9.
- «*nitidus* *Trochilus* J. Latham, Index Orn., 1790, 305.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Trochilus albus*.
- Noachica* *Patella* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 577. [— *Patella noachina*.]
- nobilis* *P[sittacus] aestivus* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 351.
- Nocens* [*Cancer*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 70.
- Nocticorax* *Ardea* J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 469. — *Ardea nycticorax*.
- Nocticula* *Lampyris* [errore pro *Noctiluca*, Linn.] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 297.
- noctis* [*Cerambix*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 104. — *Cerambyx*.
- nodosa* *Asteria* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 136. — *Asterias*.
- Nodosa* [*Ligula*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 58. — *Strombus lividus*.
- non volitans* [*Exocoetus*] P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. XVI.

- norvegica [Columba] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 591. — Columba domestica, var. norvegica.
- norvegicus F[alco] g[yrfalco] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1800, p. 138.
- «norvegicus Picus, J. Latham, Index Orn., 1790, 236.» in Sherborn, 1902; addendum: — Picus canus.
- norvegicus H[olocentrus] m[arinus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 536. — Perca norvegica.
- Norvegica Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 327. — Perca norvegica.
- Notacanthus M. E. Bloch, Abh. Böhm. Ges. Wiss. 1787, III, 1788, p. 278. — Pisces. [In Sherborn, 1902, p. LIX als «* Notocanthus [fett!] M. E. Bloch, Abh. böhm. Ges. Wiss. 1787 (1788), 278.» angeführt.]
- Notatum [Haustrum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 30. — Murex neritoideus, Linnaeus.
- Notkensis P[icus] r[uber] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 535.
- «*Notocanthus M. E. Bloch, Abh. böhm. Ges. Wiss. 1787 (1788), 278.» in Sherborn, 1902, p. LIX: delendum [vide supra Notacanthus].
- Novaculus [Onustus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 28.
- novae Angliae P[hyseter] m[acrocephalus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, I, 1797, p. 481.
- «novae hispaniae Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1088.» in Sherborn, 1902; addendum: — Cerastes mexicanus.
- novae hispaniae Hystrix J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg., Linnéisch. Natursyst., I, 1792, p. 398.
- novae Seelandiae [Alauda] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 799. [In Sherborn, 1902 als: «novae seelandicae [2 Worte fett!] Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 799.» angeführt.]
- «novae seelandicae Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 799.» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Alauda novae Seelandiae].
- novae Zealandiae [Alauda] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 497. — Alauda novae seelandiae. P.
- novae Zealandiae [Parus] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 571. — Parus novae seelandiae.
- novae Zelandiae [Falco] [errore pro: novae Zealandiae] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 28. — Falco novae seelandiae.
- Noveboracus [Vespertilio] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 71.
- nudus C[yprinus] c[arpio] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 778. — Cyprinus nudus.
- Numidica [Neritella] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 57.

- nummularis Diodon J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 600. — *Diodon mola*.
- Nux Aromatica [Cypraea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 8. — *Cypraea arabica*.
- Nyctala Strix, P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 100. — *Strix Nyctea*.
- Nymphaea Aphis P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 514. — *Aphis nymphaeae*.
- Nymphaea Chrysomela P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 195. — *Chrysomela nymphaeae*.
- N. Zealandiae [Anas] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 870. — *Anas novae seelandiae*.
- Oblongatum [Trapezium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 50.
- oblongus [Diodon] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 163. — *Diodon atinga*.
- «oblongus Gyrinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 100.» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- «obscura Fringilla, J. Latham, Index Orn., 1790, 460.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Fringilla atra*.
- Obscurum [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
- Occidentalis [Cypraea] Argus [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9.
- Occidentalis [Musica] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 18. — *Voluta musica*.
- Occidentalis [Pectunculus] Tulipa [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49.
- Occidentale [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
- «ocelot Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 90.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Felis pardalis*.
- «Ochotona H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 52 [n. n.] [kursiv!] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] — M.» in Sherborn 1902; delendum «[n. n.]» [= nom. nud.] et addendum: (cf. p. 74).
- «ochracea Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 928.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Fringilla albo-ochracea*.
- Ochrocephala L[oxia] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 371. — *Loxia mexicana* Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 174.
- octopodia Saepia P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 113. — *Sepia*.
- oculatus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 107. — *Cerambyx*.
- Oculus Tauri [Uber] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 21.
- Odoabaenus Rosm[arus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 109. — *Trichechus rosmarus*.

- officinalis* Saepia, P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 115. — Sepia.
- olivaceus* O[riolus] c[ristatus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 467.
- «*olivaceus* Sturnus, J. Latham, Index Orn. 1790, 325.» in Sherborn, 1902; addendum: — Sturnus fuscus.
- Olla [Melo] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 16. — Voluta.
- Omisco Maycus Salmo J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 65. [In Sherborn erst aus «J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 415» angeführt.]
- «*onisco-maycus* Salmo J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 646.» in Sherborn, 1902; addendum: — Errore pro: *omisco-maycus* Salmo (s. d. supra).
- «*opacus* Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 117.» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- Ophidion S[ygnathus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 168. — Syngnathus.
- Ophidion [Sygnatus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 792. — Syngnathus.
- Ophidium Syngnathus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 3. — Syngnathus ophidion.
- ophiura* Asteria P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 139. — Asterias.
- Opossum Didelphys [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 3. Th., 1778, tab. CXLVIA, [1777] (cf. t. c., 1778, p. 537). — Didelphis. [Betreffs der Daten s. Sherborn, 1892, p. 589 und Poche, 1912 e, p. 131 f.]
- orientalis* [Anas Cygnoid[es]] Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 122.
- orientalis* Crotalus G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 151.
- Orientalis* [Cypraea] Argus [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9. — Cypraea argus.
- orientalis* Didelphys [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 3. Th., 1778, tab. CLII, [1777] (cf. t. c., 1778, p. 550). — Didelphis. [Betreffs der Daten s. Sherborn, 1892, p. 589 und Poche, 1912 e, p. 131 f.]
- Orientalis* [Musica] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 18. — Voluta ebraea.
- Orientalis* [Pectunculus] Tulipa [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49.
- Ornithorhynchus J. F. Blumenbach, Götting. Anz. gel. Sach. 1800, I, p. 611 (cf. p. 600) (v. 19. April). — Mammalia. [In Sherborn, 1902 aus «J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen. no. 41, 1800» und aus «J. F. Blumenbach, Voigt's Mag. Naturk. II (1) 1800, 205» angeführt; jedoch hat die hier citierte Stelle (die eine unmittelbare Mitteilung Blumenbachs an die «königl. Societät der Wiss.» [in Göttingen] enthält) zweifellos eine allerdings geringe Priorität, da es daselbst ausdrücklich heisst, dass die Vorstel-

lung dieses Thieres «im . Heft der naturhistorischen Abbildungen, so wie die ausführlichere Beschreibung im nächsten Stück von Hrn. Hofr. Voigt's [Voigt fett!] neuem Magazin, erscheinen wird», wie andererseits Blumenbach in den Abbild. nat.hist. Gegenst. bereits auf das betreffende (62.) Stück der Götting. Anz. gel. Sach. verweist.]

Orpheus Sparus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 280. — Sparus orphus.

«orphus Aurata, A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 358» in Sherborn, 1929; pro «358» lege: 356.

Oryzae Curculio [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 244 [nom. nud.].

«osbeck Trachinus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 3.» in Sherborn, 1902; addendum: — Trachinus adscensionis.

«osbeckii Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 87.» in Sherborn, 1902; addendum: — Psittacus javanicus, J. R. Forster.

ossifagus [Labrus] Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 286; Linné, op. c., 12. Aufl., I, [Pars I], 1766, p. 478. [In Sherborn, 1902 als «ossifragus [fett!] Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 478.» angeführt.]

Ossifraga [Falco] M. T. Brünnichius, Ornith. Boreal., 1764, p. 3.

«ossifragus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 256.» in Sherborn, 1902; addendum: — Falco ossifraga. P. [Ossifragus ist ein Substantivum.]

«ossifragus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 478.» in Sherborn, 1902; delendum [vide supra Labrus ossifagus].

Os Tauri [Cassida] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 19. — Buccinum rufum, Linnaeus.

Ovata [Chersina] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 63.

ovis arietis Pediculus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., H, 1775, p. 1031. — Pediculus ovis.

«ovoviviparus Blennius, id. ac [2 Wörter kursiv!] viviparus ? B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 459.» in Sherborn, 1902; delendum: «?» [cf. Lacépède, t. c., p. 496 f.].

Ovum [Bulla] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 7. — Bulla naucum.

Ovum [Cardium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49. — Cardium serratum, Linnaeus.

Ovum [Licium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 7. — Bulla

Paca Camelus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. 1. Th., 1773, p. 372. — Camelus pacos.

Pacifica [Musica] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 18.

Paco [Camelus] P. Boddarta, Elench. Animalium, I, 1785, p. 155. — Camelus pacos.

Palja Salmo J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1797, p. 67. — Salmo lepechini.

- pallida* Sciaena J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 320.
- Panariolum* [*Pectunculus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — *Venus fimbriata*.
- Pangolinus* [*Manis*] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 74.
- Pannosus* [*Lacinia*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 54.
- Panthera* [*Cassida*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 19.
- Pantherinus* [*Acus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 31. — *Buccinum dimidiatum*.
- pantherinus* [*Anarhichas*] J. F. Gmelin in Linné Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1144. — *Anarrichas*.
- Papalis* [*Mitra*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 36. — *Voluta mitra* var. *papalis*. [In Sherborn erst aus «J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 135» angeführt.]
- Papilionis* [*Conus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 12.
- Papilionis* [*Pecten*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 51.
- Papio* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., I, 1773, p. 118 (cf. p. 119). — *Mammalia*.
- papposa* *Asteria* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 131. — *Asterias*.
- Papua* *Apterodytes* [ex: «*Apterodyte Papua*»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 277. — *Aptenodytes*.
«*papuensis* *Upupa*, J. Latham, Index Orn. 1790, 279.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Upupa fusca*.
- paradisaea* *Alcedo* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 191 (cf. p. 186). — *Alcedo paradisea*.
- paradisaeus* [*Cuculus*] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 186. — *Cuculus paradiseus*.
- paradisaeus* *Polynemus* [ex «*Polynemi paradisaei*»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 278. [= *Polynemus paradiseus*.]
- Paradisaea* [*Sterna*] M. T. Brünnichius, Ornith. Boreal., 1764, p. 46.
- paradisaeus* *Trochilus* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 206. [— *Trochilus paradiseus*.]
- Paradiseus* *Colibri* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 263. — *Errore pro: Paradiseus Trochilus* [cf. p. 262 u. Regist., Sign. Ss 5].
- paradisea* [*Galbula*] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 245. — *Alcedo*. [In Sherborn erst aus «F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 209» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- paradoxus* *Orni horynchus* [errore pro: *Ornithorhynchus*] J. F. Blumenbach, Götting. Anz. gel. Sach. 1800, I, p. 609 (cf. p. 611) (v. 19. April). [In Sherborn, 1902 als: «*paradoxus* [fett!] *Ornithorhynchus*, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 41, 1800.» und «*paradoxus* [fett!] *Ornithorhynchus*, J. F. Blumenbach, Voigt's Mag. Naturk. II (1) 1800, 205.» angeführt; je-

- doch hat die hier citierte Stelle zweifellos eine allerdings geringe Priorität (s. das oben sub *Ornithorhynchus* Gesagte).]
- Paradoxus* [*Pectunculus*] [G. Humphreys], *Mus. Calonn.*, 1797, p. 47. — *Venus*.
- Paramoecium* J. Hermann, *Tab. Affin. Animalium*, 1783, *Tab. Affin. Animal.* [— *Paramaecium*.]
- parasiticus* *Cataractes* [ex: «*Cataractis parasitici*»] J. Hermann, *Tab. Affin. Animalium*, 1783, p. 145. — *Larus*. [In Sherborn erst aus «*J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. I* (1) *June 1819, 101*» angeführt.]
- «*parr aqua Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 632.*» in Sherborn, 1902; addendum: — *Phasianus parraka*.
- Paru* [*Stromatheus*] J. A. Donndorff, *Zool. Beytr. XIII. Ausg., Linnéisch. Natursyst., III*, 1798, p. 257. — *Stromateus*.
- parvus* B[os] c[affer] G. A. Suckow, *Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, I*, 1797, p. 380.
- Parva* [*Phoca*] P. Boddaert, *Elench. Animalium, I*, 1785, p. 172. — *Phoca pusilla*.
- parva* *Sitta* J. Hermann, *Tab. Affin. Animalium*, 1783, p. 204.
- «*passan Apterionotus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 200.*» in Sherborn, 1902; addendum: — *Gymnotus albifrons*.
- «*patavinus Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 628.*» in Sherborn; addendum: *Phasianus gallus, var. patavinus*.
- Patulum* [*Haustrum*] [G. Humphreys], *Mus. Calonn.*, 1797, p. 30. — *Buccinum*.
- Pavonia* *Ardea* P. L. St. Müller, *Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 370.* — *Ardea pavonina*.
- pectinata* *Asteria* P. L. St. Müller, *Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 140.* — *Asterias*.
- Pectinatum* [*Triplex*] [G. Humphreys], *Mus. Calonn.*, 1797, p. 40.
- Pectiniformis* [*Lampas*] [G. Humphreys], *Mus. Calonn.*, 1797, p. 45.
- «*pectoralis Loxia, J. Latham, Index Orn., 1790, 390.*» in Sherborn, 1902; addendum: — *Loxia americana*.
- «*pectoralis Trochilus, J. Latham, Index Orn., 1790, 306.*» in Sherborn, 1902; addendum: — *Trochilus gramineus*.
- Pectorosum* [*Uber*] [G. Humphreys], *Mus. Calonn.*, 1797, p. 21.
- pedestris* *Cerambix* [P. Höslin], *Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II*, 1782, p. 105. — *Cerambyx*.
- pelagicus* *Scomber* J. J. Walbaum in: P. Artedi, *Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III.*, 1792, p. 223.
- pelagicus* *S[ygnathus]* G. A. Suckow, *Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth. 1799, p. 168.* — *Syngnathus*.
- Pelagicus* [*Sygnatus*] J. A. Donndorff, *Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III*, 1798, p. 790. — *Syngnathus*.
- Pelamys* [*Scomber*] G. A. Suckow, *Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 572.* — *Scomber pelamis*.

- «*pelamys Thynnus* (Salv.), G. Cuvier, R. Anim. II, 1817, 313. — Scomber, L. 1758.» in Sherborn, 1929; delendum [kommt nicht vor, sondern nur Sc[omber] pelamys].
- Pelcol Salmo* J. J. Walbaum in P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 74 [errore pro: *Salmo Peled* (cf. t. c. p. 720)].
- Pelecanus* C. Nozeman u. A. Vosmaer in: P. H. G. Moehring, Geslacht. Vogelen. Uit Latyn vertaald Aantek. vermeerd. door C. Nozeman, En uitgeg. Voorred., Aantek. vermeerd. door A. Vosmaer, 1758, p. 4 u. 47. — Aves.
- «*penelope Anas*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 527; var. [kursiv!] *kagolca*.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Anas kogolka*.
- Penelops* [*Anas*] M. T. Brünnichius, Ornith. Boreal., 1764, p. 16. — *Anas penelope*.
- «*pennanti Holocentrus*, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 711.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Perca*. P.
- Pennanti* [*Perca*] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 526.
- Pennanti* P[*sittacus*] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 270. — *Psittacus pennantii*.
- pennicornis* [*Phalaena*] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 251 [nom. nud.].
- «*pennsylvanica Fringilla*, J. Latham, Index Orn. 1790, 445.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra *Fringilla pensylvanica*.]
- pensilvanica Motacilla* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 460. — *Motacilla pensylvanica*.
- pensilvanica* [*Sphex*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 316. — *Sphex pensylvanica*.
- pensilvanica* [*Venus*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 478. — *Venus pensylvanica*.
- pensylvanica* [*Fringilla*] J. Latham, Index Ornith, I, 1790, p. 445. — *Fringilla albicollis*. [In Sherborn, 1902 als «*pennsylvanica* [fett!] *Fringilla*, J. Latham, Index Orn. 1790, 445.» angeführt.]
- «*pentadactylus Phasianus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 626.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Phasianus gallus*, var. *pentadactylus*.
- Pepo* [*Melo*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 16.
- Perdix* [*Alatus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38. — *Strombus canarium*.
- Perdix* [*Cardium*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49. — *Cardium medium*.
- Perdix* [*Cassida*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 19. — *Buccinum Pomum*.
- Perdix* [*Dolium*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 19. — *Buccinum*. [In Sherborn erst aus «G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 182» angeführt.]
- «*peregrinus Falco*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788,

- 272; var. [kursiv!] *tartaricus*.» in Sherborn, 1902; delendum «var. [kursiv!] *tartaricus*» [vide infra *Falco peregrinus tartaricus*].
- peregrinus* *Pediculus* Gueldenstaedt, Nov. Comm. Acad. Sci. Petropolit. XIV, 1769 [errore: 1759] I, 1770, p. 455.
- perforatus* *Cerambyx* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 108. — *Cerambyx*.
- «*perioides* *Labrus*, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 260.» in Sherborn, 1902; addendum: — «*Labrus perioidis*», und das ganze Citat vor (statt nach) diesem letzteren einzufügen.
- Periscelis* *Sygnathus* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 172. — *Sygnathus*.
- Periscelis* *Sygnathus* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 797. — *Sygnathus*.
- Perspectivus* [*Physeter*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 25.
- peruviana* [*acerta*] [*caudiverbera*] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 94. — *Caudiverbera peruviana*.
- Peruviana* [*Patella*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 3.
- Perversa* [*Chersina*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 63. — *Helix perversa*, Linnaeus.
- Perversa* [*Ficus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 32. — *Murex*.
- Pes Felis* [*Pecten*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 52. — *Ostrea*. [In Sherborn erst aus «L. A. G. Bosc. s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 268» angeführt.]
- «*Petaurista* H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 52 [n. n.] [kursiv!] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.]. — M.» in Sherborn, 1902; delendum «[n. n.] [= nom. nud.], et addendum: (cf. p. 78).
- Petiveri* *Cassida* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 51. — *Cassida petiveriana*.
- Petiveriana* [*Lacerta*] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 266 (cf. p. 263 f.).
- Phalaenaris* [*Pecten*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 51.
- Phalangius* *Didelphys* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. (cf. p. 77). — *Didelphis orientalis*.
- Phasianus* [*Senectus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 25.
- Phatagus* [*Manis*] P. Boddart, Elench. Animalium, I, 1785, p. 74. — *Manis tetradactyla*.
- Philander* *Didelphys* J. C. D. Schreber, Säugthiere, 3. Th., 1777, tab. CXLVII (cf. t. c., 1778, p. 541). — *Didelphis*. [Betreffs der Daten s. Sherborn, 1892, p. 589 und Poche, 1912 e, p. 131 f.]
- philippensis* [*Bucco*] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 203. — *Bucco philippinensis*.
- philippensis* *Corvus* J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I] 1788, p. 375.

- Philippensis *Merops* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 247. [— *Merops philippinus*.]
- philippinensis *Corvus* [rachyurus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 423. — [Anscheinend *Corvus brachyurus*, var. philippensis.]
- «phoebe *Muscicapa*, J. Latham, Index Orn. 1790, 489.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Muscicapa atra*, J. F. Gmelin.
- Pholis M. E. Bloch, Schrift. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin X, 2. St., 1791, p. 245. — Myxine.
- «physalis *Physsochloa*, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, 285.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Holothuria*.
- «pica *Alca*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 551; var. [kursiv!] *baltica*.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Uria balthica*.
- Pica* [*Apiculum*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 26. — Turbo.
- Pica* [*Isis*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 68. — *Isis hippuris*.
- «picatus *Lanius*, J. Latham, Index Orn. 1790, 73.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lanius leverianus*.
- Pictus* [*Alatus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38. — *Strombus gibberulus*.
- Picta* [*Cochlea*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 60.
- Picta* [*Nerita*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 22. — *Nerita polita*.
- pigargus* *Cervus* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 143. — *Cervus pygargus*.
- pigmaeus* *Moschus* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 134. — *Moschus pygmaeus*.
- Pigmaea* [*Papilio*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 219.
- «pileatus *Trochilus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 318.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Trochilus puniceus*.
- Pilori* [*Mus*] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 92 [Augenscheinlich als wissenschaftlicher Name gebraucht.]
- «pinaru *Blennius*, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Blennius cristatus*.
- Pinnatus* *Choetodon* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 4. Th., 1774, p. 165. — *Chaetodon*.
- Pinnatum* [*Triplex*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40. — *Murex tripterus*.
- piperivorus* *Rh[amphastos]* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. (cf. p. 184). [— *Ramphastos*.]
- «pipilans *Psittacus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 105.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra *Psittacus pipilans*].
- pipilans* [*Psittacus*] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 105. — *Psittacus australis*, J. F. Gmelin. [In Sherborn, 1902 als «pi-

- pilans [fett!] Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 105.» angeführt.]
- Pipistrella [Vespertilio] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 69. — Vespertilio pipistrellus.
- Pipistrelle Vespertilio P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 16. — Vespertilio pipistrellus.
- piraria [Vorticella] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 624. — Vorticella pyraria.
- Pisor Bruchus, P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 206. — Bruchus pisi.
- Pisorius Bruchus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, Regist. sämtlicher secdis Th. Linn. Thierr., p. 144. — Bruchus pisor. P.
- pithyoursus Emberiza [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 435. — Emberiza pithyornus.
- Pitui [Picus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl. I, [Pars I.], 1788, p. 432. — Picus pitius.
- planatus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 100. — Cerambyx.
- «plancus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 257.» in Sherborn, 1902; delendum [= Falco plancus, J. F. Miller].
- «planiceps Testudo, [? J. G. Schneider] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.], Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, pl. VII.» in Sherborn, 1902; dele [?] [s. t. c., p. 259]; pro: «1792» lege: 1791; adde: — Testudo platycephala. P.
- «platurus Trochilus, J. Latham. Index Orn. 1790, 317.» in Sherborn, 1902; addendum: — Trochilus longicaudus.
- platycephala Testudo J. G. Schneider, Schrift. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin X, 1791, p. 261.
- platyrhynchus S[qualus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 102. — Squalus platyrhynchus.
- Platyrynchos [Anas] M. T. Brünnichius, Ornith. Boreal., 1764, p. 15. — Anas platyrhynchos.
- Pleurorhynchus Nau, Naturforsch. XXV, 1791, p. 26. — Pleurorhynchus. [In Sherborn erst aus «K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (1) 1801, 58» angeführt.]
- Plicaria [Mitra] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 36. — Voluta. [In Sherborn erst aus «G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 169» angeführt.]
- Plicatus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38. — Strombus urceus.
- «plicatus Buceros, J. Latham, Index Orn. 1790, 146.» in Sherborn, 1902; addendum: — Buceros obscurus.
- Plumbea Motacilla J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 738. — Sylvia.

- plumbea R[ana] b[oans] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 86.
- plumier Gobius [B. G. E. de] La Cepède, Hist. Nat. Poissons, II, An VIII [1800], p. 537 (cf. p. 562). — Gobius plümiéri.
- Plumierii Coryphaena J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 103. — Coryphaena plümiéri.
- «plumipes Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.» in Sherborn, 1902; addendum: — Phasianus gallus, var. plumipes.
- Podalyrius Pap[ilio] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 429. — Papilio podalirius.
- poekilorhyncha [Anas] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 535. — Anas poecilorhyncha.
- Poki Sparus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 296.
- Polachius Gadus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 127. — Gadus pollachius.
- Policerata [Ovis aries] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 153. — Ovis aries, var. polycerata.
- Polykomos S[im]ia —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., I. Th., 1796, p. 33. — Cebus. [In Sherborn erst aus «J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 213» angeführt.]
- polyzonía Sertularia P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., II, 1775, p. 852. — Sertularia polyzonias.
- pomeranus L[anius] r[ufus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 241. — Lanius pomeranus.
- Pompadora Gracula P. S. Pallas, Spicileg. Zool., fasc. V., 1769, p. 18.
- Pomphylius [Nautilus] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 395.
- Ponderosus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49.
- Pongo S[im]ia Sat[yrus] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. [nom. nud.].
- ponticerianus [Falco] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 23. — Falco pondicerianus.
- ponticeriana [Muscicapa] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 471. — Muscicapa pondiceriana.
- Populella [Phalaena] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 251 [nom. nud.].
- populeus Cerambyx [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 106. — Cerambyx populneus.
- Populn[ea] Tenthred[on] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 251.
- Porcellum [Buccinum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 34. — Murex femorale.
- Porphirio [Voluta] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 394. — Voluta porphyria.

- praecisa Chimaera J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., p. 588. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Bevtr. III. 1798, 836» angeführt.]
- pratinea Hirundo [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 474. — Hirundo pratincola. [Auch schon in P. L. S. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., II, 1773, p. 635; hier aber offenbar nur errore (cf. Regist. Ordn., Geschl. Art. Sign. Tt.).]
- prehensilis Histrix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 108. — Hystrix.
- Prismatica [Cuma] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 35.
- Productum [Rapum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 37.
- Protea [Oliva] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 10.
- Pruniella [Phalaena] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 245 [nom. nud.].
- Pseudodentex Sparus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 276.
- Psittaca Emberiza P. L. St. Müller. Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 568. — Emberiza psittacea.
- Psittacea [Margaritifera] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 44.
- Puda [Aries] H. F. Link. Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 96 (cf. p. 47 u. 97). — Capra.
- Puda A[ries] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 97. [— Aries Puda. P.] [In Sherborn erst aus «G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 406» angeführt.]
- puffin Procellaria [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 313. — Procellaria puffinus. P.
- Puffinus [Procellaria] Brünnichius, Ornith. Boreal., 1764, p. 29. [In Sherborn erst aus «Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 213» angeführt.]
- Pugilinus [Ficus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 32. — Murex.
- «pulchellus Hemerobius, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 118.» in Sherborn, 1902; pro «Bloch» lege: Block.
- pulchella Strix P. L. St. Müller. Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 69. — Stryx.
- Pulchra [Patella] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 3.
- «pulchricornis Tipula, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 120.» in Sherborn, 1902: pro «Bloch» lege: Block.
- Pullus [Eutropia] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 23.
- Pulsatorius [Termiculus] J. F. Blumenbach, Handb. Naturgesch., 3. Aufl., 1788, p. 433. — Termes.
- «pumilio Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.» in Sherborn, 1902; addendum: Phasianus gallus, var. pumilio.
- punctatus [Blennius Gunnellus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1181. — Blennius punctatus.

- punctatus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 107. — Cerambyx punctatus, Linnaeus.
- Punctatus Choetodon P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 4. Th., 1774, p. 166. — Chaetodon.
- punctata L[acerta] M[onitor] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 98. — Stellio punctatus.
- Punctata [Mitra] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 36. — Voluta pertusa.
- punctata [Perca] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1311. — [errore? pro] Perca labrax.
- Punctuata [Auris Mustelae] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 22. — Voluta solidula.
- «punctulatus Callionymus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 328.» in Sherborn, 1902; addendum: — Callionymus ocellatus.
- Punctulatus [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 15.
- pungitivus Gasterosteus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 446. — Gasterosteus pungitius.
- Purpureum [Apiculum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 26. — Trochus umbilicaris.
- pustulatus Blennius J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 188. [In Sherborn, 1902 als «pustulatus [fett!] Blennius, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 314.» angeführt.]
- pustulosa R[ana] v[entricosa] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 69. — Bufo pustulosus.
- «putaol Gymnotus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 145.» in Sherborn; addendum: — Gymnotus fasciatus.
- pygmaeus [Cervus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 102. — Moschus.
- pygmaea Platalea [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 330. — Platalea pygmaea.
- pygmaeus [Sirex] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 307. — Sirex pygmeus.
- pygmaea [Alca] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 796. — Alca pygmaea.
- Pyri Aphis [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 246 [nom. nud.].
- Pyri Cynips [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 246 [nom. nud.].
- Pyri Tenthredo [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 246 [nom. nud.].
- Quadrifidus [Strombus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 39. — Aporrhais.
- quadriguttata Chrysomela [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch

- Nat.-Syst., II, 1782, p. 70. — *Chrysomela octoguttata*, Linnaeus.
- quaterlineata *Lacerta* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 509. — *Lacerta quadrilineata*.
- quatermaculatus *Cerambix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 102. — *Cerambyx quadrimaculatus*.
- «quattuordecimpunctata *Coccinella* Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.» in Sherborn, 1902: delendum [vide infra *Coccinella* 14-pustulata].
- 14-pustulata [corr.: quattuordecimpustulata] [*Coccinella*] Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 368; Linné, op. c., 12. Aufl., Pars II, 1767, p. 585. [In Sherborn, 1902, als: «quattuordecimpunctata [fett!] *Coccinella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.» angeführt.]
- quattuordecim pustulata *Coccinella* Linnaeus, Fauna Suec., 2. Aufl., 1761, p. 159. [— *Coccinella* 14-pustulata. P.]
- Quela *Emberiza* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 564. — *Emberiza quelea*.
- Quercinus* [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 12. — *Conus figulinus*.
- [*Quercus*] *Lanaria* [Cynips] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 249 [nom. nud.].
- [*Quercus*] *Radici* [Cynips] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 249 [nom. nud.].
- quinquies lineata *Lacerta* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 502. — *Lacerta quinquelineata*.
- Quiscal [Gracula] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 397. — *Gracula quiscal*.
- Radiatus* [Senectus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 47. — *Donax cuneata*.
- Radula* [Cardium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 50. — *Cardium isocardia*.
- Radula* [Pecten] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 52. — *Ostrea lima*.
- Ramosum* [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40. — *Murex*. [In Sherborn erst aus «G. Perry, Arcana, 1810. sign. S 6» angeführt.]
- ramphygeus *Cerambix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 107. — *Cerambyx*.
- «rapa *Bulla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1184.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Murex*, Linnaeus.
- rarior [Cyclopterus Lumpus] Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, 3. Th., 1789, p. 1474. — *Diodon raninus*.

- Ratel Vierra A. Sparrman, Vet. Acad. Handl. XXXIX, 1777, [p. ?] [Mir ist nur die deutsche Übersetzung dieses Werkes: Schwed. Akad. Wiss. Abh. 1777, XXXIX, 1782, zugänglich: hier p. 134 und ganz zweifellos als wissenschaftlicher Name gebraucht.] [In Sherborn, 1930 als «ratel [fett!] Viverra, Sparrmann, K. Vet. Ak. Handl. 1777, 148 [ratel vernac. est, non usu spec. [5 Worte kursiv!]]» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- «ratel Viverra, Sparrmann, K. Vet. Ak. Handl. 1777, 147 [ratel vernac. est, non usu spec. [5 Worte kursiv!]]» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1930: pro «Sparrmann» lege: Sparrman, et vide supra Vierra ratel.
- Rayella [Phalaena] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 284. — Phalaena (Tinea) rajella.
- Rectangula Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 720. — Phalaena (Geometra) rectangulata.
- rectidentatus [Physeter] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 111.
- Recurvatum [Cardium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49.
- Regius Cyprinus B. S. Nau, Naturforsch. XXV, 1791, p. 29.
- Regius [Pecten] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 52. — Ostrea pallium.
- Remora [Echeneis] Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 260; Linné, op. c., 12. Aufl., I, [Pars I.], 1766, p. 446. [In Sherborn, 1902 als «remora [fett!] Echineis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 446.» angeführt.]
- «remora Echineis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 446.» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Echeneis Remora].
- Renke S[almo] M[araena] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 694. — Salmo renke.
- repandirostris Scar[abaeus] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. [nom. nud.].
- Restitutoris [Cochlea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 60. — Helix lucorum.
- reticulata Asteria P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 135. — Asterias.
- reticulatus [Diödon Hystrix] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III, 1789, p. 1449. — Diödon reticulatus.
- «reticulatus Gryllus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 635. — Acheta.» in Sherborn, 1902: delendum [= Gryllus reticulatus (Fab.), J. F. Gmelin].
- Reticulatus [Murex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 37. — Voluta reticulata, Linnaeus.
- Reticulatus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — Venus.

- reversa Capra Hircus Linn. [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 5. Th., [I, 1. Hälfte], tab. CCLXXXVI u. CCLXXXVI. B, [1787]. [Betreffs des Datums s. Sherborn, 1892, p. 589].
- reversa C[apra] H[ircus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, I. 1797, p. 325. — Capra reversa.
- rex Clupea J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 687.
- Rex Cyprinus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars. III., 1792, p. 24. — [Cyprinus] rex - cyprinorum.
- Rhamphastos J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. (cf. p. 184). [— Ramphastos.]
- «Rhea M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 8. — A.» in Sherborn, 1902; delendum [= Rhea Moehring].
- «Rhea J. Latham, Index Orn. 1790, 665. — A.» in Sherborn, 1902; delendum [= Rhea Moehring].
- rhombus Chaet[odon] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. (cf. p. 352).
- Rhynchopsalia Sterna P. S. Pallas, Spicileg. Zool., fasc. V., 1769, p. 18.
- Rigida [Ligula] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 58. — Murex fuscatus.
- ringens Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 354.
- Ringuia Colymbus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 889. — Colymbus minor, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 585.
- Rolandria Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 728. — Phalaena (Tortrix) rolandiana.
- «rosaceus Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 108.» in Sherborn, 1902; addendum: — Psittacus moluccensis.
- Rosarium [Apiculum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 26. — Trochus pharaonius.
- Rosea [Bulla] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 7. — Bulla amplustre.
- roshalis Anguis, errore pro: rostralis, C. E. Weigel, Schrift. Berlin. Ges. naturf. Freunde III, 1782, p. 193. [In Sherborn, 1902 als «rostralis [fett!] Anguis, C. E. Weigel, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, III. 1782, 190.» angeführt.]
- Rosmarus Trichecus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 171. — Trichecus.
- «rostralis Anguis, C. E. Weigel, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, III. 1782, 190» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Anguis roshalis].
- Rostratus Choetodon P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 4. Th., 1774, p. 168. — Chaetodon.
- Rostratus [Cochlus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 24.
- Rostratum [Rapum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 37.

- rostratus [Scomber] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 360 (cf. p. 359). — Scomber Saurus. P. [In Sherborn erst aus «J. Hermann, Obs. Zool. 1804, 304» angeführt.]
- rostratus Sparus [ex: «Sparoque rostrato»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 351.
- «rostratus Todus, J. Latham, Index Orn. 1790, 268.» in Sherborn, 1902; addendum: — Todus platyrhynchus.
- Rotundatus Chaetodon P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., IV, 1774, p. 174. — Chaetodon rotundus. P. [In Sherborn erst aus «B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 452» angeführt.]
- rotundatus Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 626. — Chaetodon. P.
- «rotundus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 466.» in Sherborn, 1902: pro «278» lege: 277.
- Rubecula [Dactylus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9. — Voluta glabella.
- «rubellio Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Icht. (3) ed. 2, 1792, 264.» in Sherborn, 1902; addendum: — Labrus griseus. P.
- rubens Asteria P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 132. — Asterias.
- rubens Col[uber] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 270.
- ruber C[yprinus] c[arpio] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 778. [Augenscheinlich als Name einer Einheit des Systems gebraucht.]
- ruber F[alco] g[entilis] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 168. — Falco communis, var. ruber.
- ruber F[elis] C[atus] d[omesticus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, I, 1797, p. 272. — Felis catus, var. ruber.
- rubra R[ana] a[rborea] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 84.
- Rubetta Motacilla P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 609. — Motacilla Rubetra.
- Rubicundus [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 15. — Conus granulatus.
- rubicunda Trigla Hornstedt, Vet. Acad. Nya Handl. IX, 1788, p. 49 [sp. nova!]. [Mir ist nur die deutsche Uebersetzung: Schwed. Akad. Wiss. Neue Abh. IX, 1788, 1789, zugänglich: hier p. 45; die Seitenzahl des Originals citiert nach Carus und Engelmann, 1861, 2, p. 1050.]
- «rubicinosus Lanius G. A. Suckow, Naturges. II (1) 1800, 249.» in Sherborn 1902; addendum: — Lanius ferrugineus, Richard & Bernard.
- rubricapillus [Mergus Merganser] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 545. — Mergus rubricapilla, M. T. Brünnich.

- rubus* *Cerambyx* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 101. — *Cerambyx rubus*, Linnaeus.
- rufifrons* F[alco] Boie, Isis XXI, 1828, 1828, col. 314. [In Sherborn, 1930 als «*rufifrons* [fett!] *Nertus* (Wied), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314. — *Falco*.» und jener Name erst aus «Max Wied, Beitr. Naturges. Brasil. III (1) 1830, 123» angeführt.]
- «*rufifrons* *Nertus* (Wied), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 314. — *Falco*.» in Sherborn, 1930: delendum [kommt nicht vor (vide supra *Falco rufifrons*)].
- «*rufa* *Anas*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 515.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Anas ruficollis*, J. A. Scopoli.
- Rufus Anguis* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 218. — *Anguis rubra*.
- «*rufus* *Coluber*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1105.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Naja brasiliensis*.
- rufus* *Ursus arctos* —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 298.
- Rugosus* [Sol] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 28.
- «*rupicola* *Columba*, J. Latham, Index Orn. 1790, 590.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Columba domestica*, var. *saxatilis*.
- russicus* [*Gadus Mustela*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1174. — *Gadus fuliginosus*. P.
- russicus* [*Lepus Cuniculus*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 164.
- rusticus* *Cerambyx* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 108. — *Cerambyx*.
- Rusticus* [*Mytilus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 43. — *Mytilus modiolus*.
- Rustica* [*Pygmaea*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 28. — *Voluta*.
- Ruthensparri* *Gobius* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 341. — *Gobius ruuthensparri*. [In Sherborn erst aus «Euphrasen in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 48» angeführt.]
- ruthenus* *Accipenser* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 568. — *Acipenser*.
- «*rutilus* *Lanius*, J. Latham, Index Orn. 1790, 70.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lanius collurio*, var. *rufus*.
- Sabea* [*Cercopithecus*] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 59. — *Simia sabaea*.
- Saepia* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 13 (cf. p. 112). — *Sepia*. [In Sherborn erst aus «G. Fischer de W., Nat. Mus. Paris, II. 1803, 371» angeführt.]
- saepiola* *Saepia* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 118. — *Sepia sepiola*.

- sagax Canis P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 207. — *Canis familiaris*, var. *sagax*.
- Sagrinatus [Pecten] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 52. — *Ostrea scabra*.
- Salaria Gadus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 143. — *Gadus salarias*.
- salsus Bufo F. v. P. Schrank in F. v. P. Schrank u. Moll, Nathist. Briefe Oestreich, Salzburg, Passau, Berchtésgraden, I, 1785, p. 308. [In Sherborn erst aus «J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 213» angeführt.]
- «salsa Rana, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1049.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Bufo*. P.
- Samulus S[almo] F[ario] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 669 [errore 689]. — *Salmo samulus*. P.
- «samulus Salmo J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 61.» in Sherborn, 1902; addendum: — Errore pro *Salmo salmulus* [cf. t. c., p. 720].
- Sanguinea Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 734. — *Phalaena* (*Pyralis*) *sanguinalis*.
- Sanguisuga [Mitra] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 36. — *Voluta*. [In Sherborn erst aus «J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138» angeführt.]
- Saphirinus [Trochilus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 684. — *Trochilus saphirinus*.
- «sapiens Homo, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 1; varr. . . . [kursiv!] *tartarus*.» in Sherborn, 1902: delendum «*tartarus*» [vide infra *Homo Sapiens Tatarus*].
- Sardonyx [Cypraea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9. — *Cypraea Talpa*.
- Sarroubea L[acerta] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 139. — *Lacertus sarroube*.
- «sauijala Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 356.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Turdus nigerrimus*.
- Saurus Esox J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 93.
- Saurus [Scomber] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 360 (cf. p. 359).
- saxatilis Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 626. — *Chaetodon*.
- Sayga [Capra] J. R. Forster, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 344. [Dieser Name ist in Sherborn, 1902 zwar angeführt, aber an unrichtiger Stelle des Alphabets (p. 863), sodass er also dort praktisch fast so gut wie fehlt.]
- scabra [Testudo] Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl. I, III. T., 1789, p. 1040. — *Testudo verrucosa*.

- Scabriuscula [Cochlea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 61.
— *Helix gualtierana*.
- scalaris Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 106. — *Cerambyx scalaris*, Linnaeus.
- «scandens Gracula, J. Latham, Index Orn., 1790, 193.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Gracula cayennensis*. P.
- Scapha [Melo] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 16.
- Scarabaeus [Otis] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 62. — *Helix*.
- Schaeferi Meloe P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 383. — *Meloe schaeferi*.
- Schaenobanus [Sylvia] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 510.
— *Motacilla schoenobaenus*.
- Schlosseriana Lac[erta] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 253. — *Lacerta amboinensis*.
- schoeniculus Emberiza [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 433. — *Emberiza schoeniclos*.
- Schoenobenus Motacilla P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 604. — *Motacilla schoenobaenus*.
- Schoepfii Diodon J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 601. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III. 1798, 786» angeführt.]
- Schöur P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. 45 [nom. nud.]. — Pisces.
- Schotaf S[ciaena] G[aterina] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 485. — *Sciaena schotaf*.
- Scolopax [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
«scont Phoca, P. Boddaert, Elench. 1785, 172.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Phoca jubata*.
- Scorodosma Rana J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 257.
— *Bufo fuscus*.
- Scorpioides Bi[ennius] [ex: «Bi[ennium] Scorpioidem»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 335.
- Scorpoena [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 72. — *Scorpaena*.
- Scoticus Canis J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.] I, 1789, p. 201.
- «scriptus Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13. I. 1789, 1463.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra *Balistes Monoceros Scriptus*].
- scriptus Balistes J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 462. — *Balistes Monoceros Scriptus*. P.
- Scriptus [Balistes Monoceros] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1463. [In Sherborn, 1902 als «scriptus [fett!] Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13., I. 1789, 1463.» angeführt; cf. oben p. 484 f.]

- Scriptus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48.
— Venus.
- Scropha [Scorpaena] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 353. — Scorpaena scrofa.
- Scropha Sus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 462. — Sus scrofa. [In Sherborn erst aus «P. L. St. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 58» angeführt.]
- scythica Antilope P. S. Pallas, Spicileg. Zoolog., Fasc. I., 1767, p. 9. — Capra tartarica.
- scytica Antilope P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 53. — Antilope scythica. P.
- sedecimpunctata Coccinella Linnaeus, Fauna Suec., 2. Aufl., 1761, p. 156.
- 16-pustulata [corr.: sedecimpustulata] [Coccinella] Linnaeus, Syst. Nat., 10. Aufl., I, 1758, p. 368; Linné, op. c., 12. Aufl., I, Pars II., 1767, p. 585. [In Sherborn, 1902 als «sexdecimpunctata [fett!] Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.» angeführt.]
- sedecimpustulata Coccinella Linnaeus, Fauna Suec., 2. Aufl., 1761, p. 159. [— Coccinella 16-pustulata. P.]
- «semicollaris Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 103.» in Sherborn, 1902: addendum: — Psittacus multicolor.
- Semilunaris [Phoca] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 170. — Phoca groenlandica.
- Semiviolacea [Neretoidea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 20. — Helix Janthina.
- senegalensis Alauda [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 404. — Alauda senegallensis.
- «senegalensis Colius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 842.» in Sherborn, 1902: addendum: — Lanius macrourus.
- Senegalensis Fringilla J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 221.
- «senegalensis Glareola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 696.» in Sherborn, 1902; addendum: — Tringa fusca, Linnaeus.
- Senegalensis L[anius] r[ufus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 241. — Lanius collurio, var. senegalensis.
- senegalensis Picus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst. I, 1781, p. 274. — Picus senegallensis.
- senegalensis Tringa [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 352. — Tringa senegallensis.
- Senegallus Lanius P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 117. — Lanius senegalus.
- Senegalla Parra P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 431. — Parra senegala.

- Senegallus Tetrao P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 127. — Tetrao senegalus.
- senegalus Turdus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 414. — Turdus senegallus.
- «seniculus Cuculus, J. Latham, Index Orn. 1790, 219.» in Sherborn, 1902; addendum: — Cuculus minor.
- Senticosum [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
- sentis Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 101. — Cerambyx.
- «septentrionalis Lepus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 73.» in Sherborn, 1902; addendum: — Lepus variabilis.
- serraticornis [errore pro: serraticornis] Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat. Syst., II, 1782, p. 108. — Cerambyx serraticornis.
- Sericus [Comus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 16. — Conus geographus.
- serotine Vespertilio P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 16. — Vespertilio serotinus.
- «serpens Lacerta, M. E. Bloch, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, II, 1776, 33.» in Sherborn, 1902; addendum: — Anguis quadrupes.
- serpens Lacerta [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 499. — Lacerta seps.
- «serpentiniformis Cepola, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 525.» in Sherborn, 1902; addendum: — Cepola rubescens.
- serratella [Phalaena] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 245 [nom. nud.].
- serratus [Mergus Serrator] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 546. — Mergus serratus.
- «serval Felis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 523.» in Sherborn, 1902; delendum [= Felis serval J. C. D. Schreber, welche Erxleben ausdrücklich citiert.]
- Setosus [Sus] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 157. — Sus scrofa.
- «sexdecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.» in Sherborn, 1902: delendum [vide supra Coccinella 16-pustulata].
- «sexdentata Chrysis, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 106.» in Sherborn, 1902: pro «Bloch» lege: Block.
- «sexsetacea Paradisea, J. Latham, Index Orn. 1790, 196.» in Sherborn, 1902; addendum: — Paradisea aurea, J. F. Gmelin.
- «sey Gadus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 367.» in Sherborn, 1902; addendum: — Gadus virens.
- Sibbaldi S[ygnathus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 170. — Syngnathus.
- Sibbaldi [Sygnatus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linneisch. Natur-Syst., III, 1798, p. 796. — Syngnathus.

- sibila *Motacilla* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 464. — *Motacilla sibilla*.
- sibiricus [Aries] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 96. [— *Ibex*.]
- sibiricus *Locusta* [ganz zweifellos errore pro: *Gryllus*] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 270. — *Gryllus (Locusta) sibiricus*.
- Sibirica Ph[ocal] —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 142. — *Phoca vitulina sibirica*. P.
- «sibirica *Phoca*, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804—1811 (1815), 64 [n. n.]» [kursiv!] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1930: delendum [s. supra *Phoca sibirica*].
- sibirica [*Phoca vitulina*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, 1. T., 1788, p. 64. [In Sherborn augenscheinlich dieselbe Form erst aus «R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 124» angeführt.]
- Sidjan P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. 44. [Anscheinend als subgenerischer Name gebraucht.] — *Pisces*.
- Signanthus J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 466. [— *Syngnathus*.]
- silvarum [Apis] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 332. — *Apis silvarum*, Linnaeus.
- silvarum [Musca] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 352. — *Musca silvarum*.
- Silvatica *Cicindela* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 329. — *Cicindela sylvatica*.
- sylvaticus [Mus] J. C. P. Erxleben, Syst. Regni Animal., 1777, p. 388. — *Mus sylvaticus*.
- sylvatica [Tenthredo] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 306. — *Tenthredo sylvatica*.
- silvestris [Cimex] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 187. — *Cimex silvestris*, Linnaeus.
- silvia *Motacilla* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 459. — *Motacilla sylvia*.
- Simak *Ophidium* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 255. — *Ophidium simack*.
- Simia-Sciurus Lemur [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 1. Th., 1775, tab. XLII, [1776] [S. Poche, 1912 e, p. 130 f. und betreffs des Datums Sherborn, 1892, p. 588.]
- Sinensis C[orvus] b[rachyurus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 425.
- Sinensis *Lacerta* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 133. — *Lacerta chinensis*.
- sinensis [Sitta] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I], 1788, p. 442. — *Sitta chinensis*.
- Sinensis [Sus Scrofa] J. C. P. Erxleben, Syst. Regni Animal., 1777, p. 181.

- sinensis [*Sus Scrofa domesticus*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 218.
- Singularis [*Cochlus*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 24.
- Siphunculus J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 384. — *Siphunculus*.
- Siren J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, Tab. Affin. Animal. (cf. p. 120). — «Mammalia».
- Siren J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 559. — «Plagiuri» [ergo «Mammalia». (Animal fabulosum!)].
- Siren [*Muraena*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1136. — *Siren lacertina*. [In Sherborn erst aus «J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 154» angeführt.]
- Sirm Clupea J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 38.
- Sirsaeir [*Anas*] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 877. — *Anas sirsair*.
- Skua Cataractes [ex: «Cataractem Skuam»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 145. — *Catharacta*.
- S Littera Chrysomela P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 185. — *Chrysomela s-litera*.
- «socialis Lemmus (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75. — Mus.» in Sherborn, 1902; delendum (kommt nicht vor, sondern nur *Mus socialis*).
- sociata Actinia J. Ellis, Philos. Trans. LVII, 1767, 1768, p. 428 (cf. p. 433). [In Sherborn erst aus «Ellis & Solander, N. H. Zooph. 1786, 5 [see [kursiv!] Phil. Trans. LVII. 1767, 436]» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- Sofat S[ciaena] G[aterina] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 485. — *Sciaena sofat*.
- Solea [*Ostrea*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 52. — *Mya vulsella*.
- Sonchi Aphis [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 248 [nom. nud.].
- «songarus Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 269.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Mus sungorus* [cf. t. c., p. 86].
- Sonneratii [*Psittacus*] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 98. — *Psittacus sonneratii*.
- «sparrmanni Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 876.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Anas alandica*.
- Spathula [ex: «Spathulam»] [*Squalus*] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 301. [In Sherborn erst aus «J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 522» angeführt.]
- «spectrum Prosimia (Erx.), P. Boddaert, Elench. 1785, 66. — *Pteropus*.» in Sherborn, 1902; statt «(Erx.)» lies: (Pall.) und statt «*Pteropus*» lies: *Lemur*.
- «speoris [*Vespertilio*] Schneider, Beschr. Fledermaus Ostindien, 4-to

- Frankfurt a/O. [no date ? c. [kursiv!] 1817]: pl. 59 B in Schreiber, Säugth. (1800).» [die Stellen in [] sind von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1930: pro «? c. 1817» lege: vor 1807, wahrscheinlich 1797 oder kurz vor- oder nachher (s. Poche, 1912e, p. 147 und Am., 1804, p. 170 f.; auch Geoffroy-Saint-Hilaire, 1813, p. 261 führt bereits diese Abhandlung Schneiders an) et pro «(1800)» lege: (1797 [cf. Poche, 1912 e, p. 137 und Am., l. c.]).
- Sphynx P. S. Pallas, Reise versch. Prov. Russ. Reichs, I, 1771, p. 472. [— Sphinx.]
- sphyrena Argent[ina] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 451. — Argentina sphyraena.
- «spilopterygius Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 455.» in Sherborn, 1902; addendum: — Balistes forcipatus.
- spinibarbis Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 99. — Cerambyx spinibarbis.
- «spinipes Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 116.» in Sherborn, 1902: pro «Bloch» lege: Block.
- Spinoletta [Alauda campestris] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 794. — Alauda spinoletta.
- Spinus Cyclopterus P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 3. Th., 1774, p. 332. — Diodon.
- Spinus Cyclopterus O. F. Müller, Zool. Danic. Prodr., 1776, p. IX. [In Sherborn erst aus «O. Fabricius, Skr. nat. Seisk. [Copen.] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.], IV (2) 1798, 27» angeführt.]
- spinus [Cyclopterus Lumpus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1474. — Diodon spinus.
- Spinus [Lacinia] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 54.
- Spinus [Triplex] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
- Spiralis [Pedium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 5. — Nautilus spirula.
- Spurius? [Monodon Monoceros] J. A. Donndorff, Zool. Beytr., XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792, p. 760. — Monodon spurius.
- squamigera [sic!] Rana J. G. Schneider, Schrift. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin X, 1791, p. 281. — Rana squamigera.
- Squallus J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 464. — Squalus.
- squammata Testudo J. G. Schneider, Schrift. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin X, 1791, p. 281. — Testudo squamata.
- «squamosus Notopterus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 189.» in Sherborn, 1902; addendum: — Gymnotus asiaticus.
- squarrosus S[ygnathus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 171. — Syngnathus.

- squarrosus Sygnatus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 797. — Syngnathus.
- stellatus Accipenser P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 194. — Acipenser.
- Stellata [Patella] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 4. — Patella saccharina.
- sterilis C[yprinus] c[arpio] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 779. [Augenscheinlich als Name einer systematischen Einheit gebraucht!]
- stigma Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 109. — Cerambyx stigma, Linnaeus.
- Stincus H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 1. St., 1794, p. 80. — Scincus. [In Sherborn erst aus «F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30» angeführt.]
- Strepsiceros [Aries] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St., 1795, p. 96. — Ovis [s. t. c., p. 47 u. 97].
- Striata [Haliotis] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 20. — Haliotis marmorata.
- striata [Hyaena] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 93. — Canis hyaena.
- striatus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 109. — Cerambyx striatus, Linnaeus.
- striatus Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 625. — Chaetodon.
- Striatus [Dactylus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9. — Voluta dactylus.
- striatus Picas [errore pro: Picus] P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 91. [In Sherborn, 1902 als «striatus [fett!] Picas, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 91.» angeführt.]
- «striatus Picas, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 91.» in Sherborn, 1902: pro «91» lege: Regist.-Supplbd. enthalt. Geschl. Art., Sign. Bb 5 [vide supra Picas striatus].
- «strömei Parus, J. Latham, Index Orn. 1790, 563.» in Sherborn, 1902; addendum: — Parus ignotus.
- Stromatheus Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 255. — Stromateus.
- «Strombus [G. Humphreys], [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] Mus. Calonn., 1797, 39. — G.» in Sherborn, 1902: delendum [= Strombus Linnaeus, pt.].
- Stryx P. S. Pallas, Reise versch. Prov. Russ. Reichs, I, 1771, p. 455. [— Strix.]
- Sturio Accipenser O. F. Müller, Zool. Danic. Prodr., 1776, p. 39. — Acipenser.
- suaveolens Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 105. — Cerambyx.

- Subbuteo major* Falco J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], II, 1791, p. 315.
- subfuscus* Labrus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 254. [In Sherborn erst aus «J. A. Domndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 477» angeführt.]
- Succinctus* [Alatus] [G. Humphreys], Mus Calonn., 1797, p. 38. — Strombus.
- succinctus* [Cerambix] P. Höslin, Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 102. — Cerambyx.
- «*suillus* Spalax (Schr.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 76. — Mus.» in Sherborn, 1902; delendum (kommt nicht vor!).
- «*sujef* Muraenoides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 324.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Blennius muraenoides*.
- «*sujefianus* *Blennius*, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Blennius simus*.
- Sulcatum* [Dentalium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 2. — *Dentalium elephantinum*.
- sulcata* L[acerta] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 147. — *Bipes canaliculatus*.
- sumpit* *Centriscus* [B. G. E. de] La Cepède, Hist. Nat. Poissons, II, An VIII [1800], p. 93. — *Centriscus velitaris*.
- sungorius* Mus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 124. — *Mus sungorus*.
- superba* Parad[isaea] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 166/7.
- «*superba* *Upupa* J. Latham, Index Orn. 1790, 279.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Upupa magna*.
- «*suricatta* *Viverra*, see [kursiv!] J. C. D. Schreber, Säugth. III., pl. XCVII (1776).» in Sherborn, 1902; pro «XCVII» lege: CXVII.
- «*suricatta* *Viverra* [? Schr.], [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.], J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 488.» in Sherborn, 1902; delendum [= *Viverra suricatta* Schreber (P.), welche Erxleben ausdrücklich citirt].
- Surikatta* *Viverra* [J. Herrmann [sic!] in] G. C. Würtz, Affin. Animalium Tab., 1777, p. 9. [— *Viverra suricatta* in J. C. D. Schreber. P.]
- «*surinamensis* *Certhia*, J. Latham, Index Orn. 1790, 295.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Certhia ochrochlora*.
- Surinameus* *Turdus* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 539. — *Turdus surinamus*.
- Surinamus* *Cerambix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 106. — *Cerambyx*.
- [*Sutor*] *Cerambix* [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 103. — *Cerambyx*.
- Sygnathus* G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 41 (cf. p. 166). — *Sygnathus*.

- sylvestris Felis Catus* J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], I, 1789, p. 262. — *Felis catus*, var. *ferus*.
- Sylvestris Mus* J. Hermann, Tab. Affin. Animalium. 1783, p. 91.
- Sylviella Motacilla* J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 737. — *Sylvia*.
-
- Tabaccaria* [*Fistularia*] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 651. — *Fistularia tabaccaria*.
- «*tabak Chaetodon* J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 421.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Chaetodon fasciatus*, P. Forskål.
- «*tacaud Gadus*, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 366.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Gadus barbatus*.
- Tadornis Anas* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 2. Th., 1773, p. 279. — *Anas tadorna*.
- taedella* [*Phalaena*] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 250 [nom. nud.].
- Taeniatum* [Uber] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 21.
- «*taguan Petaurista*, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Sciurus petaurista*, P. S. Pallas.
- Tahmel* P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. 45 [nom. nud.]. — Pisces.
- «*taioa Gobiomorus*, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II, 1800, 583.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Gobius strigatus*.
- taitiensis* [Rallus] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 759. — *Rallus tahitiensis*.
- Talling Scomber* J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 222.
- Talpa* [*Cypraea*] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 9. — *Cypraea testudinaria*.
- Tamandua* [*Myrmecophaga*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 53. — *Myrmecophaga tridactyla*.
- Tamandua Guaçu* [*Myrmecophaga*] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 54. — *Myrmecophaga jubata*.
- tamaricinus Mus* P. S. Pallas, Nov. Spec. Quadruped. Glirium Ord., 1778, Fasc. II, [1779], p. 88. — *Mus tamariscinus*. [S. Sherborn, 1891.]
- Tanrec* [*Erinaceus*] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 129. — *Erinaceus ecaudatus*.
- «*tapeti Lepus*, P. Boddaert, Elench. 1785, 100.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lepus brasiliensis*.
- Tapir H*[*hydrochoerus*] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St. 1795, p. 105. [— *Hydrochaerus*.]
- Tarabe* [*Psittacus*] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 125. — *Psittacus taraba*.

- Tartarica Alauda J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 216.
— Alauda tatarica.
- tatarica Buprestis P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 248. — Buprestis tartarica.
- Tatarica Capra P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 417. — Capra tartarica.
- tataricus [Falco peregrinus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 272. [In Sherborn, 1902 als «peregrinus [fett!] Falco. J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1788, 272; var. [kursiv!] tartaricus.» angeführt.]
- Tataricus Gryllus (Locusta) P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 5. Th., I, 1774, p. 441. — Gryllus (Locusta) tartaricus.
- Tatarus [Homo Sapiens] J. C. P. Erxleben, Syst. Regni Animal., 1777, p. 1. [In Sherborn, 1902 als «sapiens [fett!] Homo, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 1; varr. [kursiv!] ... tartarus.» angeführt.]
- Telescopium [Clava] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 32. — Trochus.
- tentabunda T[rigla] v[olitants] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 610. — Trigla tentabunda. «terek Scolopax, J. Latham, Index Orn. 1790, 724.» in Sherborn, 1902; addendum: — Scolopax cinerea.
- teres [Delphinus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I, 2. St. 1795, p. 112. — Delphinus feres.
- Termiculus J. F. Blumenbach, Handb. Naturgesch., 3. Aufl., 1788, p. 433 (cf. p. VI). — Copeognatha.
- Terrae novae [Canis Familiaris] J. F. Blumenbach, Handb. Naturgesch., 4. Aufl., 1791, p. 90. [Von Sherborn erst aus «J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 666» angeführt.]
- tessellata L[acerta] M[onitor] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 97. — Stellio tessellatus.
«tessellata Testudo, J. G. Schneider, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, 262.» in Sherborn, 1902: pro «1792» lege: 1791.
- testaceus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 109. — Cerambyx testaceus, Linnaeus.
- «tetracarinatus Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 116.» in Sherborn, 1902: pro «Bloch» lege: Block.
- tetradactylus C[anis] Fam[iliaris] —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 177. — Canis tetradactylus.
«tetradactyla Viverra, P. S. Pallas in J. C. D. Schreber, Säugth. III. (1777) 434.» in Sherborn, 1902; addendum: — Viverra suricatta P.
- Tetradon J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 465. — Tetraodon.

- tetragonus Sor[ex] —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 344. — [Errore pro:] Sorex tetragonurus.
- Tetragonus [Sygnatus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 788. — Syngnathus.
- textor Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 104. — Cerambyx.
- Textorium [Licium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 7. — Bulla volva.
- thalassina L[acerta] M[onitor] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 98. — Stellio thalassinus.
- Thiara [Vesica] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 58. — Helix amarula.
- Thomae Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 98. — Cerambyx.
- Thryps J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 436. — Thrips.
- thujia [Sertularia] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 618. — Sertularia thujia. P.
- thujia Sertularia P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., II, 1775, p. 838. — Sertularia thuja.
- tibiatrix R[ana] a[rborea] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 85. — Hyla tibiatrix.
- «tigrinus Gobius, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3). ed. 2. 1792, 204.» in Sherborn, 1902; addendum: — Gobius gronovii.
- Tigrina [Lendix] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 64.
- Tigris lutea [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 11.
- Tiliae Cynips [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 246 [nom. nud.].
- Tiligugu Laclerta] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 263.
- Tinca notha Cyprinus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 33.
- tipulaeformis [Sphinx] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 241. — Sp[hinx] tipuliformis [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.].
- Tocro T[etrao], J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 165.
- Tom Cod Gadus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 133. [In Sherborn erst aus «J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 8» angeführt.]
- Tomineo [Trochilus Colubris] Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 492. — Trochilus tomineo.
- tophaceus [Phasianus] J. Latham, Index Ornith., II, 1790, p. 628. — Phasianus gallus, var. tophaceus. [In Sherborn, 1902 als «morio [fett!] Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 628... varr. [kursiv!] tophaceus . . .» angeführt.]
- Torcula [Terebra] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 23. — Turbo duplicatus.

- «*tornator Cerambyx*, J. A. Scopoli. Del. Insub. II, 1786, 38.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Lamia*.
- «*tornator Cerambyx* (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 103. — *Lamia*.» in Sherborn, 1902; delendum [vide supra *Cerambyx tornator*, J. A. Scopoli].
- torquatus* [*Charadrius vociferus*] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl. I, Pars II., 1788, p. 685. — *Charadrius torquatus*, Linnaeus.
- Torquatus* [*Conus*] [*G. Humphreys*], Mus. Calonn., 1797, p. 15.
- torquatus* C[orvus] c[orone] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 397.
- «*torquatus Lemmus* (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75. — *Mus*.» in Sherborn, 1902: delendum (kommt nicht vor, sondern nur [*Mus*] *torquatus*).
- «*torquatus Trochilus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 309.» in Sherborn, 1902: addendum: — *Trochilus purpuratus*.
- tortrix* [*Curculio*] [*Linnaeus in:*] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 251 [nom. nud.].
- tota alba* [*Talpa europaea*] J. C. P. Erxleben, Syst. Regni Animal., 1777, p. 117.
- Toui* [*Psittacus*] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 134. — *Psittacus tovi*.
- «*trachyrhynchos Pelecanus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 884.» in Sherborn, 1902; addendum: *Pelecanus erythrorhynchos*.
- Tragopogonis Phalaena* [*Linnaeus in:*] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 248 [nom. nud.].
- Tragulus* [*Cervus*] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I. 2. St. 1795, p. 102.
- transparens* R[aja] R[hinobatos] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 76. — *Raja percellens*.
- «*Trapezium* [*G. Humphreys*], Mus. Calonn., 1797, 50 [n. n.] [kursiv!] [die Stellen in [] sind von Sherborn — d. Verf.]. — *L.*» in Sherborn, 1902: dele «[n. n.]».
- tredactylus* B[radypus] H. F. Link, Beytr. Naturgesch., I. 2. St., 1795, p. 68 (cf. p. 47). — *Bradypus tridactylus*.
- Tremellae Acarus* [*Linnaeus in:*] E. O. Rydbeck, Pandora Insectorum (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 252 [nom. nud.].
- tremula* [*Phalaena*] [*Linnaeus in:*] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 251 [nom. nud.].
- Tribulus* [*Murex*] [*G. Humphreys*], Mus. Calonn., 1797, p. 37. — *Voluta ceramica*.
- «*trichechus Manati*, P. Boddart, Elench. 1785, 173.» in Sherborn, 1902: delendum [vide infra *Trichechus Manati*].
- Trichechus* P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 1. Th., 1773, p. 171. — *Trichechus*. [In Sherborn erst aus «Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 685» angeführt.]

- Trichecus [Manati] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 173.
— Trichechus manatus. [In Sherborn, 1902 als «trichechus [fett!] Manati, P. Boddaert, Elench. 1785, 173.» angeführt.]
- Trichurus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 244. — Trichiurus. [In Sherborn erst aus «J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, p. LVIII» angeführt.]
- tricirratu[s] [Gadus Mustela] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1174. — Gadus tricirratu[s].
- tricolor C[erthia] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 646. — Certhia viridis, J. Latham.
- tricolor Motacilla [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 467. — Motacilla tricolora.
- «Tridacna Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86. — L.» in Sherborn; addendum: — Tridachna.
- trifasciatus Chaetodon J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 408.
- trifurcus Gadus J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 139.
- trigloides Trachinus? J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 358.
- trilineatus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 107. — Cerambyx.
- trinca Labrus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 636. — Labrus tinca.
- Tringa [Phalaena] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 244 (nom. nud.).
- triestegus Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 625. — Chaetodon.
- Trissa Clupea J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 41. — Clupea thrissa.
- tristis Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 104. — Cerambyx.
- tristis Paradisea J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 195. — Paradisea.
- Fritici Phalaena [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 242 [nom. nud.].
- Trochilus C. Nozeman u. A. Vosmaer in: P. H. G. Moehring, Geslacht. Vogelen. Uit Latyn vertaald Aantek. vermeerd. door C. Nozeman, En uitgeg. Voorred., Aantek. vermeerd. door A. Vosmaer. 1758, p. 6 u. 63. — Aves.
- trochlearis Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 96. — Cerambyx.
- Troglodites S[im]ia —, Ritters Linné vollst. Natursyst. Fortsez., 1. Th., 1796, p. 3. — Simia Troglodytes.
- Truncata [Lämpas] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 45. — Anomia.

- truncatus [Tetrodon Mola] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1448. — *Tetrodon truncatus*.
- «tschavvytscha Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 71.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra Salmo tshawytscha].
- Tschekantschia [Motacilla] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 731. — *Motacilla tschecantschia*.
- Tshawytscha Salmo J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 71. [In Sherborn, 1902 als «tschavvytscha [fett!] Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 71.» angeführt.]
- Tuber [Sol] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 28. — *Trochus*.
- Tuberculatus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 39. — *Strombus lentiginosus*.
- Tuberculatum [Apiculum] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 26. — *Trochus magus*.
- tubifer Lumb[ricus] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 383.
- Tulipa [Mytilus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 43.
- Tulipa [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 49.
- Tulipa [Tellina] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 47.
- «tunstalli Emberiza, J. Latham, Index Orn., 1790, 418.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Emberiza chlorocephala*.
- «turcicus Phasianus, J. Latham, Index Orn., 1790, 627.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Phasianus gallus*, var. *turcicus*.
- Typhle S[ygnathus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 1. Abth., 1799, p. 167. — *Syngnathus*.
- Typhle [Sygnatus] J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 788. — *Syngnathus*.
- Tysonis Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 351. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III. 1798, 526.» angeführt.]
- «uarnak Raja, Gmelin, Syst. Nat. I (3) 1789, 1509 [vernac. [kursiv!] Forsk.].» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] in Sherborn, 1931: delendum [vide infra Raja Pastinaca Uárnak].
- Uárnak Raja J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 534. — *Raja Pastinaca Uárnak*. P.
- Uárnak [Raja Pastinaca] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars III., 1789, p. 1509. [In Sherborn, 1931 als «uarnak [fett!] Raja, Gmelin, Syst. Nat. I (3) 1789, 1509 [vernac. [kursiv!] Forsk.].» [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] angeführt.]
- Ular Lawa (coluber) J. G. Schneider, Leipzig. Mag. Naturk. Oekon. 1787, p. 224.

- uliginosus F[alco] p[ygargus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 135. — Falco uliginosus.
- uncinatus C[yprinus] carpio G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 780.
- undatus [Cerambyx] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 110, Nr. 79. — Cerambyx.
- undatus Cerambyx, errore pro sanguineus, [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 110, Nr. 80. — Cerambyx sanguineus.
- Undata [Glycymeris] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 50. — Arca glycymeris.
- Undatus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 47. — Venus meroë.
- Undata [Terebra] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 82.
- Undulatus [Cochlus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 24.
- «unernak Ophidium, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 278.» in Sherborn, 1902; addendum: — Ophidium viridis.
- «ungula Vespertilio P. Boddaert, Elench. 1785, 71.» in Sherborn, 1902; addendum: — Vespertilio ferrum-equinum.
- «unicolor Perca J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 352.» in Sherborn, 1902: delendum [vide infra Perca unicolor].
- unicolor Perca J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., III, 1798, p. 526. — Perca unicolor. P.
- Unicornu [Rhinoceros] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 162. — Rhinoceros unicornis.
- unicolor [errore pro: unicolor] Perca J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 352. [In Sherborn, 1902, als «unicolor [fett!] Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 352.» angeführt.]
- uralensis Strix P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst. Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 68. — Stryx.
- Ursina [Tridachna] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 50. — Chama hippopus.
- Urus [Bos Taurus Ferus] Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., I, 1792, p. 684. — Bos urus.
- «uvae Coccus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 266.» in Sherborn, 1902: delendum [vide infra Coccus Uvae Ursi].
- Uvae ursi Coccus [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora. Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 244 [nom. nud.].
- Uvae Ursi Coccus Linnaeus, Fauna Suec., 2. Aufl., 1761, p. 266. [In Sherborn, 1902 als «uvae [fett!] Coccus, Linnaeus, Faun. suec., ed. 2, 1761, 266.» angeführt.]
- Vaccinii [Phalaena] [Linnaeus in:] E. O. Rydbeck, Pandora Insect. (in: Linnaeus, Amoen. Acad., V), 1758, p. 244 [nom. nud.].

- vagabundus Choetodon [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 626. — Chaetodon.
- vaginatus Cervus [ex: «Cervi vaginati»] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785, p. 137. — Cervus vaginalis.
- Vanelli [Bulla] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 7. — Bulla ampulla.
- Vanelli [Cypraea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 8.
- variabilis [Cerambix] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 109. — Cerambyx.
- Variabilis [Musica] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 18. — Voluta lapponica.
- variegatus H[olocentrus] m[arinus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, IV, 2. Abth., 1799, p. 536.
- Variegata [Larva] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 4.
- Variegatus [Pecten] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 51.
«variegatus Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 233.» in Sherborn, 1902; addendum: — Picus bicolor.
- variegata Talpa E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. Mensch. vierfüß. Thiere, II, 1780, p. 389.
- varius Blennius J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 187. [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 314» angeführt.]
- Varia [Clava] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 32.
- varius Corvus J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 1. Th., 1794, p. 341.
- varia C[orvus] C[ornix] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 412.
- varius Corvus frug[ilegus] J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], III, 1793, p. 779.
- varius C[orvus] glandarius] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 430.
- varia C[orvus] P[ica] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 410.
- varius Falco gallinarius J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], II, 1791, p. 263.
- varius Falco Islandus J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], II, 1791, p. 296.
- varius Lanius Exc[ubitor] J. M. Bechstein, Anhang erst. Bande Lathams allg. Uebers. Vögel, 1793, p. 691.
- varius M[omotus] b[rasiliensis] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 374.
- varius Pavo J. A. Donndorff, Zool. Beytr. XIII. Ausg. Linnéisch. Natursyst., II, 2. Th., 1795, p. 25.
- varia [Tringa Squatarola] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, Pars II., 1788, p. 682. — Tringa varia.
- «varius Trochilus G. A. Suckow, Naturg. II. [1]1800, 675.» in Sherborn, 1902: delendum [= Trochilus varius, J. F. Gmelin].

- Varius [Turbo] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 22. — Turbo littoreus.
- veliferum Pteridium J. J. Walbaum in: P. Artedi, Gen. Piscium, Ichthyol. Pars III., 1792, p. 697. — Coryphaena.
- vena medinensis Gordius P. Forskål, Descript. Animalium, 1775, p. XXVI.
- venaticus Canis J. M. Bechstein, Naturgesch. Deutschlands, [1. Aufl.], I, 1789, p. 202.
- Venator [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 12.
- «venosus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1085.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Aspis cobella*.
- «venosus Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2., 1792, 264.» in Sherborn, 1902: delendum [= *Labrus venosus*, J. F. Gmelin].
- Ventricosa [Oliva] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 10.
- Verrucosa [Lycium] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 7. — Bulla.
- Verrucosus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — Venus.
- verrucosa T[estudo] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 38. — Testudo (ferox?) verrucosa. P.
- verrucosa Testudo (ferox?) J. D. Schöpf, Naturgesch. Schildkröt., 1792, Heft 3, [1793], p. 105. [Betreffs des Datums s. Engelmann, 1846, p. 423.]
- Versicolor [Cepa] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 45.
- Versicolor [Isis] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 69.
- Versicolor [Pecten] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 51.
- «vertagus Canis, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII, (2), 1768, 341.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Canis familiaris* var. *vertagus*.
- Vertagus [Margaritifera] [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, p. 44.
- Vespa [Cypraea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 8. — *Cypraea asellus*.
- vespaeformis [Sphinx] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 241. — *Sphinx vespiformis*.
- vespertilio Raia J. G. Schneider, Leipzig. Mag. Naturk. Oekon. 1788, p. 82 (cf. p. 83). [In Sherborn erst aus «J. A. Donndorff, Zool. Beytr. III. 1798, 876» angeführt.]
- Vespertinus [Conus] [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, p. 14.
- vestiaria Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 282.» in Sherborn, 1902; addendum: — *Certhia coccinea*, G. Forster.
- Vestiaria [Cuma] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 35. — *Murex trapezium*.
- veterum [Phoca] [J. Herrmann], Beschäft. Berlin. Ges. Naturforsch. Freunde IV, 1779, p. 502. [Cf. p. XV.] — *Phoca monachus*.
- Vetula [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — Venus paphia.

- Vexillum [Chersina] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 62.
 «villosus Salmo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788. 167.» in
 Sherborn, 1902; addendum: — *Salmo arcticus*, O. Fabricius.
 violaceus Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-
 Syst., II, 1782, p. 109. — *Cerambyx violaceus*, Linnaeus.
 «violacea Muscicapa (Isert), G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 391.
 — *Musophaga*.» in Sherborn, 1902: delendum [kommt nicht
 vor; vide *Musophaga violacea*].
 Violaceus [Strombus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 40.
 virens Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst.,
 II, 1782, p. 102. — *Cerambyx*.
 Virescens [Cypraea] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 8. —
Cypraea Errones.
 «virescens Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 351.» in Sherborn,
 1902; addendum: — *Turdus viridis*, J. F. Gmelin.
 virgae aureae Papilio [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-
 Syst., II, 1782, p. 234. — *Papilio (Plebejus) virgaureae*.
 viridi-fusca R[ana] a[r]borea] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch.
 Thiere, III, 1798, p. 84. — *Hyla viridi-fusca*.
 «viridis Galbula, J. Latham, Index Orn. 1790, 244.» in Sherborn,
 1902; addendum: — *Alcedo galbula*.
 viridis Labrus M. E. Bloch, Naturgesch. ausländ. Fische, V, 1791,
 p. 129.
 viridis L[acerta] M[onitor] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch.
 Thiere, III, 1798, p. 97. — *Stellio viridis*.
 viridis Lanius P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst.
 Suppl.-Regist.-Bd., 1776, p. 72.
 Viridis [Mytilus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 42. —
Mytilus unguatus.
 Viridis [Neritella] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 57. —
Nerita viridis, Linnaeus.
 viridis O[riolus] c[ristatus] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch.
 Thiere, II. 1. Abth., 1800, p. 467.
 «viridis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 125.» in Sherborn,
 1902; addendum: — *Psittacus magnus*.
 viridis R[ana] B[ufo] G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere,
 III, 1798, p. 64. — *Bufo viridis*.
 «viridis Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 299.» in Sher-
 born, 1902; addendum: — *Testudo mydas*.
 Viscaccia [Lepus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I,
 [Pars I.], 1788, p. 160. — *Lepus viscacia*. [In Sherborn erst aus
 «G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, Fr. ed., 1789, 289» angeführt.]
 Vitellus [Uber] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 21.
 Vitis idaeae Phalaena P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natur-
 syst., 5. Th. I, 1774, p. 680. — *Phalaena (Noctua) vitis idaeae*.
 Vitrea [Placuna] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 45.

- Vittatus [Alatus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 38. — Strombus.
- «vittatus Labrus J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 256.» in Sherborn, 1902; addendum: — Labrus variegatus.
- Vittatus [Pectunculus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 48. — Venus gallina.
- vittata Procellaria capensis W. Ellis, Auth. Narrat. Voyage Capt. Cook Capt. Clerke, I, 1782, p. [?] [nom. nud.]. [Mir ist nur die deutsche Übersetzung dieses Werkes: Zuverl. Nachr. dritt. letzt. Reise Capit. Cook u. Clerke, 1783, zugänglich; hier p. 8.]
- Vittata [Senectus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 25.
- «vittatus Squalus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 516.» in Sherborn, 1902; addendum: — Squalus africanus.
- «vivida Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 170.» in Sherborn, 1902; addendum: — Coracias cyanea.
- «vividus Trachinus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 353.» in Sherborn, 1902; addendum: — Trachinus draco.
- «volgensis Perca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13. I. 1789, 1309.» in Sherborn, 1902; addendum: — Perca asper, P. S. Pallas.
- volitans Scorpaena J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 344. — Gasterosteus. [In Sherborn erst aus «M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 18» angeführt.]
- Volitans Scorpoena [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797. p. 72. — Scorpaena.
- volsella [Mya] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 462. — Mya vulsella.
- «volucella Petaurista, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.» in Sherborn, 1902; addendum: — Sciurus volucella.
- Vosmaeri T[estudo] indica G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, III, 1798, p. 57.
- vulgaris [kursiv!] Capra Hircus Linn. [J. C. D. Schreber], Säugthiere, 5. Th., [I., 1. Hälfte], tab. CCLXXXIII, [1787]. [Betreffs des Datums s. Sherborn, 1892, p. 589.]
- «vulgaris Lutra, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777. 448.» in Sherborn; addendum: — Mustela lutra.
- vulgaris Paradisea G. A. Suckow, Anfangsgr. Naturgesch. Thiere, II, 1. Abth., 1800, p. 479. — Paradisaea apoda.
- vulgaris [Sus Scrofa domesticus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 217.
- Vulgaris [Talpa] P. Boddaert, Elench. Animalium, I, 1785. p. 126. — Talpa europaea.
- Vulgata [Haliotis] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 20. — Haliotis tuberculata.
- Vulgata [Oliva] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 10.

- Vulgatus [Rhombus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 33. — Murex antiquus.
- Vulpecula [Mitra] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 36. — Voluta. [In Sherborn erst aus «G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 170» angeführt.]
- Vulpes Squalus [ex: «Squali Vulpis»] J. Hermann, Tab. Affin. Animalium, 1783, p. 300. [In Sherborn erst aus «J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1496» angeführt.]
- vulpes cinerea Canis [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 75 [nom. nud.].
- Xanthornus [Oriolus] J. F. Gmelin in Linné, Syst. Nat., 13. Aufl., I, [Pars I.], 1788, p. 391. — Oriolus xanthorus.
- Xyphias J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 450. — Xiphias.
- Yzquiepatl [Viverra] [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 86.
- «zealandicae Psittacus, id. ac [2 Wörter kursiv!] novae seelandiae, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 102.» in Sherborn, 1902; delendum [vide infra Psittacus zealandicus].
- zealandicus [Psittacus] J. Latham, Index Ornith., I, 1790, p. 102. — Psittacus novae seelandiae. [In Sherborn, 1902 als: «zealandicae [fett!] Psittacus, id. ac [2 Wörter kursiv!] novae seelandiae, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 102.» angeführt.]
- Zebra [Trochus] [G. Humphreys], Mus. Calonn., 1797, p. 27.
- zeilanus Turdus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 412. — Turdus zeylonus.
- Zeilonica Certhia [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 287. — Certhia Zeylonica.
- zigaena Squalus [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst. I, 1781, p. 561. — Squalus zygaena.
- zikzak Ostrea P. L. St. Müller, Ritters Linné vollst. Natursyst., 6. Th., I, 1775, p. 303. — Ostrea ziczac.
- Zonalis Holoth[uria] J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat., 1777, p. 382.
- Zonaria Cerambix [P. Höslin], Ritters Linné Lehr-Buch Nat.-Syst., II, 1782, p. 107. — Cerambyx zonarius.
- «zonca Strix, Piesch & Leske in Cetti, Naturg. Sard. III. 1784, App., 8 [zonea?].» in Sherborn, 1932: dele «[zonea?】» [«Zonca» ist der sardinische Name des Tieres (s. Cetti, 1784, 2, p. 59)].
- «zonea Strix, G. A. Suckow, Naturg. II [1] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.] 1800, 209.» in Sherborn, 1902: delendum [kommt nicht vor, sondern Strix Zonca (s. d. supra)].
- «zorilla Viverra [? Schr.] [die Stelle in [] ist von Sherborn — d. Verf.], J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 492.» in Sherborn, 1902: delendum [= Viverra zorilla, J. C. D. Schreber, welchen Namen Erxleben ausdrücklich citiert].

1. Literaturverzeichnis

(mit Ausschluss der lediglich als Quelle von mir angeführter Namen citierten Veröffentlichungen).

- Cetti, F. (1784)**, Naturgeschichte von Sardinien, 2—3. Aus dem Italienischen.
 — **Cope, E. D. (1900)**, The Crocodilians, Lizards, and Snakes of North America. (Ann. Rep. Smithsonian Inst. 1898, Rep. U. S. Nat. Mus., p. 153—1270, tab. 1—36.).
 — **Duncan, F. M. (1937)**, On the Dates of Publication of the Society's «Proceedings», 1859—1926. With an Appendix containing the dates of Publication of the «Transactions», 1833—1869, by the late F. H. WATERHOUSE, and of the «Transactions», 1833—1869, by the late HENRY PEAVOT, originally published in P. Z. S. 1893, 1913. (Proc. Zool. Soc. London 1937, 107, Series A, p. 71—84.) — **Forskål, P. (1775)**, Descriptiones Animalium, Avium, Amphibiorum, Piscium, Insectorum, Vermium; quae in itinere orientali observavit. Herausg. von C. Niebuhr. — [**Humphreys, G. (1797)**, Museum Calonianum. [S. [Woodward]. 1903, p. 300.] — **Lankester, E. Ray (1903)**, Preface. (In: [Woodward, B. B.], Catalogue of the Books, Manuscripts, Maps and [Petit!] Drawings in the British Museum (Natural History), 1, p. V. [Cf. Lankester, t. c. p. V.] — **Linnaeus, C. (1758)**, Systema Naturae Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species, Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 10. Aufl., 1. — **Linné, C. a (1766)**, Systema Naturae, Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 12. Aufl., 1, [Pars I]. — **Linné, C. a (1767)**, Systema Naturae, Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 12. Aufl., 1, Pars II. — **Maehrental, F. C. v. (1904)**, Entwurf von Regeln der zoologischen Nomenklatur. (Zool. Ann. 1, p. 89—138.). — **Poche, F. (1911 c)**, Die Klassen und höheren Gruppen des Tierreichs. (Arch. Natgesch., 77. Jahrg., 1, 1. Supplhft., p. 63—136.). — **Poche, F. (1912 e)**, Über den Inhalt und die Erscheinungszeiten der einzelnen Teile, Hefte etc. und die verschiedenen Ausgaben des Schreiber'schen Säugetierwerkes (1774—1855). (Arch. Natgesch., 77. Jahrg., 1911, 1, 4. Supplhft., p. 124—183.). — **Poche, F. (1936)**, Neubearbeitung der Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur, zwecks Erzielung einer eindeutigen, möglichst rationellen, einheitlichen und stabilen Benennung der Tiere von der Nomenklaturkommission des Verbandes Deutschsprachlicher Entomologen-Vereine der Internationalen Nomenklaturkommission und dem Internationalen Zoologenkongress vorgeschlagen. (Konowia 15, (1936), p. 264—320.). — **Poche, F. (1938b)**, Neubearbeitung der Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur, zwecks Erzielung einer eindeutigen, möglichst rationellen, einheitlichen und stabilen Benennung der Tiere von der Nomenklaturkommission des Verbandes Deutschsprachlicher Entomologen-Vereine der Internationalen Nomenklaturkommission und dem Internationalen Zoologenkongress vorgeschlagen. (Konowia 16, (1937), p. 301—320.). — **Schulze, E. (1904)**, Conspectus classium et ordinum animalium. (Zeitschr. Natwiss. 77, p. 371—373.). — **Sherborn, C. D. (1891)**, Dates of the Parts of P. S. Pallas's 'Icones Insect. p. Ross. Sibir.' and 'Nov. Spec. Quadr. Glirium.' (Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 7, p. 236.). — **Sherborn, C. D. (1892)**, On the Dates of the Parts, Plates, and Text of Schreiber's 'Säugethiere' (Proc. Zool. Soc. London 1891, p. 587—592.) [Betreffs des Datums s. Duncan, 1937, p. 73 f.]. — **Sherborn, C. D. (1922)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part I. — **Sherborn, C. D. (1923)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part II—III. — **Sherborn, C. D. (1925)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part VI—VIII. — **Sherborn, C. D. (1926)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part IX—XI. — **Sherborn, C. D. (1927)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XII—XIV.

— **Sherborn, C. D. (1928)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XV—XVII. — **Sherborn, C. D. (1929)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XVIII—XX. — **Sherborn, C. D. (1930)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XXI—XXIV. — **Sherborn, C. D. (1931)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XXV—XXVII. — **Sherborn, C. D. (1932)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XXVIII—XXXI. — [**Woodward, B. B.**] (1903), Catalogue of the Books, Manuscripts, Maps and [Petit!] Drawings in the British Museum (Natural History), 1. [S. Lankester, 1903].

2. Literaturverzeichnis

(1. Nachtrag bei der Korrektur!)

Am., — (1804), —. (Neue allg. deutsche Biblioth. 89, 1. Stück, p. 170—176.) — **Artedi, P. (1792)**, Genera Piscium. Ichthyologiae Pars III. [2. Aufl.] Emendata et aucta a J. J. Walbaum. — **Carus, J. V., und Engelmann, W. (1861)**, Bibliotheca Zoologica. 2 Bde. (In: Bibliotheca Historico-Naturalis. Herausgeg. von W. Engelmann. Suppl.-Bd., 1861.) — **Engelmann, G. (1846)**, Index librorum Historiam Naturalem spectantium ab anno MDCC ad MDCCCXLVI in Germania, Scandinavia, Anglia, Gallia, Belgio, Italia atque Hispania impressorum, 1. Engelmann, W. (1846), Bibliotheca Historico-Naturalis, 1. — **Geoffroy-Saint-Hilaire, [É.] (1813)**, Sur un genre de Chauve-Souris, sous le nom de Rhinolophes. (Ann. Mus. Hist. Nat. 20, p. 254—266, tab. 5—6.) — **Hemming, F. (1936 b)**, On the identity and systematic position of eight species of Rhopalocera described by Jacob Hübner in his Der Schmetterlinge Lepidoptera Linnéi, [1790]—[1793] [die Daten in [] sind von Hemming — d. Verf.] (Proc. Ent. Soc. London (B) 5, p. 121—125.) — **Linné, C. a (1788)**, Systema Naturae, Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species; cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 13. Aufl., Cura J. F. Gmelin, 1, Pars [I.]—II. Lipsiae. — **Linné, C. a [1789]**, Systema Naturae Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species; cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 13. Aufl., Cura J. F. Gmelin, 1, Pars III.—IV., Lipsiae. — **Rudolphi, C. A. (1808)**, Entozoorum, sive Vermium Intestinalium Historia Naturalis, 1. — **Rudolphi, C. A. (1809)**, Entozoorum, sive Vermium Intestinalium Historia Naturalis, 2, Pars I. — **Rudolphi, C. A. (1810)**, Entozoorum, sive Vermium Intestinalium Historia Naturalis, 2, Pars II. — **Rudolphi, C. A. (1819)**, Entozoorum Synopsis cui accedunt mantissa duplex et indices locupletissimi. — **Sherborn, C. D. (1902)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Prima [.] — **Sherborn, C. D. (1924)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part IV—V. — **Sherborn, C. D. (1933)**, Index Animalium sive Index Nominum quae ab A. D. MDCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt, Sectio Secunda, Part XXXII—XXXIII. — **Sherborn, C. D., and Woodward, B. B. (1906)**, On the Dates of Publication of the Natural History Portions of the 'Encyclopédie Méthodique.' (Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 17, p. 577—582.)

(2. Nachtrag bei der Korrektur!)

Hemming, F. (1937a), Hübner [.] 2 Bde. — **Linnaeus, C. (1759)**, Systema Naturae Per Regna Tria Naturae, Secundum Classes, Ordines, Genera, Species. Cum Characteribus, Differentiis, Synonymis, Locis. 10. Aufl., 2. — **Linnaeus, C. (1760)**, Amoenitates Academicae seu dissertationes variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis, [1.

Aufl.], 5. — **Linnæus, C. (1763)**, Amoenitates Academicæ seu dissertationes variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis. [1. Aufl.], 6. — **Looss, A. (1899)**, Weitere Beiträge zur Kenntniss der Trematoden-Fauna Aegyptens, zugleich Versuch einer natürlichen Gliederung des Genus *Distomum* Retzius. (Zool. Jahrb., Syst., 12, p. 521—784, tab. 24—32.). — **Poche, F. (1938 d)**, Über die Erscheinungszeit und den Inhalt mehrerer Hefte und die verschiedenen Ausgaben von E. J. C. Esper, Die ausländische oder die ausserhalb Europa zur Zeit in den übrigen Welttheilen vorgefundene Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. (In: Festschrift zum 60. Geburtstag von Professor Dr. **Embrik Strand**, Ordinarius für Zoologie und Direktor des Systematisch-Zoologischen Instituts und der Hydrobiologischen Station der Universität Lettlands, Riga; Dr. rer. nat. h. c., M. A. N., F. R. E. S., F. L. S., F. Z. S.; Ehrenmitglied, korrespondierendes und ordentliches Mitglied vieler wissenschaftlicher Gesellschaften; etc., 4, p. 453—463.)

I N D E X.

Nomina systematica animalium, tam viventium quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum disposita, quae in opere «Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand» Vol. I—V reperiuntur.

- | | |
|--|---|
| <p>Abascantodes Strand V p. 20
 Abascantus Schauf. V p. 20
 Abida frumentum Drap. II p. 8, 9,
 12, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 34
 — secale Drap. II p. 34
 Ablepharus II p. 199
 — bivittatus Mén. II p. 201
 — Brandti Strauch II p. 198, 201
 — grayanus Stol. II p. 201
 — persicus Nik. II p. 201
 Abraxas marginata L. ab. conflua
 Strand III p. 531
 Abryna Newm. IV p. 237
 Abryna affinis Breun. n. sp. IV p. 236
 — fausta Newm. IV p. 236
 — grisescens Breun. n. sp. IV p. 236
 — metallica Breun. n. sp. IV p.
 236—237
 — obscura Schwarz. IV p. 236
 — regis-petri Paiva IV p. 236
 — subuniformis Pic IV p. 236
 Aburina III p. 549
 Abynotha III p. 547
 — Preussi (Mab. & Vuill.) III p. 547
 Acala cristana F. III p. 523
 — cristana F. ab. Larseni Strand
 V p. 33
 — schalleriana L. III p. 523
 — schalleriana L. ab. faaborgensis
 Strand V p. 33
 — variegana Schiff. ab. coeruleoat-
 rana Strand V p. 33</p> | <p>Acalles Brisouti Reitt. IV p. 658
 — Diocletianus Germ. IV p. 654
 — dromedarius Boh. IV p. 654
 — hungaricus Hajóss n. sp. IV p. 658
 — Rolleti Germ. IV p. 654
 Acalypta musci Schr. III p. 235
 Acantharctia III p. 516, 543
 Acantheae Simon I p. 22
 Acantheinae Petrunkevitch I p. 22
 Acanthestes amycteroides White V
 p. 154
 — carinata Breun. n. sp. V p. 154
 — hipporhina White V p. 154
 — spinosa Breun. n. sp. V p. 154
 Acanthinula aculeata Müll. V p. 69
 Acanthis cannabina cannabina L. II
 p. 533
 — cannabina mediterranea Tschusi
 II p. 533
 Acanthocerinae I p. 410
 Acanthodactylus II p. 552, 558
 — boskianus Daud. II p. 531, 552
 — cantoris Gthr. var. Blanfordi
 Blng. II p. 201
 — micropholis Blanf. II p. 198, 201
 — pardalis Licht. II p. 531, 552
 — scutellatus Aud. II p. 531, 552
 Acanthodes Baly (mehrere spp.) V
 p. 340—342
 Acanthodrilidae I p. 31
 Acanthodrilus Platei Michaelsen I
 p. 35</p> |
|--|---|